

Nº 2

LUIS GUTIERREZ VARGAS

**Relaciones del Desarrollo
Corporal con el Temperamento
Psicológico del Individuo**

**(Observaciones en
Enfermos Esquizofrénicos y
Maníaco Depresivos)**



TALLERES GRAFICOS "HERALDOS"

BELISARIO DOMINGUEZ, 39

MEXICO, D. F.

MEMXXXI

1932

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA

Psicología

RELACIONES DEL DESARROLLO CORPORAL
CON EL
TEMPERAMENTO PSICOLOGICO DEL INDIVIDUO

Observaciones en Enfermos
Esquizofrénicos y Maníaco Depresivos

TESIS PROFESIONAL
QUE PRESENTA
LUIS GUTIERREZ VARGAS

MEXICO, D. F.
MCMXXXI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MEXICO
FACULTAD DE MEDICINA
ENE 4 1931

A la memoria de mi padre:
Sr. Hermenegildo Gutiérrez

A mi madre:
Sra. Isabel Vargas de Gutiérrez

A mis hermanos:
María Gutiérrez Vargas
y
Luciano Gutiérrez Vargas

A mi tío:

Sr. Benito M. Vargas

A mi primo:

Sr. Dr. D. Francisco R. Vargas

A mi maestro:

Sr. Dr. D. Samuel Ramírez Moreno

A la Sr̄ita.

Lucía Romero Márquez

A la Sr̄ita.

Dra. Matilde Rodríguez Cabo

Al Sr. Dr. D.

D. T. Rubín de la Borbolla

Protesor y Encargado del Departamento de Antropología Física del Museo Nacional

INTRODUCCION

Siendo indispensable para graduarse de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de México, presentar una prueba escrita y siendo la elección del tema libre, he elegido como objetivo de tal prueba el tema que titulo "RELACIONES DEL DESARROLLO CORPORAL CON EL TEMPERAMENTO PSICOLOGICO DEL INDIVIDUO" (Observaciones hechas en enfermos Esquizofrénicos y Circulares), para el cual tomo como base de mis investigaciones la teoría de Kretschmer, que ha sido tan discutida y comentada en estos últimos tiempos, y que respetuosamente someto a la consideración del Honorable Jurado.

No cabe duda que las líneas generales de la teoría de Kretschmer son admitidas universalmente como exactas; pero no sucede así cuando se trata de fijar de manera concreta la frecuencia (porcentaje) de presentación de los tipos corporales (según su clasificación tipológica) en las psicosis que sirven a tales investigaciones (esquizofrenia y psicosis maníaco depresiva); pero como es indispensable que tales estudios sean ratificados o rectificadas científica y estadísticamente, he querido contribuir a ello con mi humilde contingente.

El tema en cuestión lo desarrollo en los siguientes capítulos:

- I.—*Antropología antigua y Antropología Moderna.
Explicación de Medidas.*
- II.—*Breves consideraciones de las relaciones de las glándulas de secreción interna, con el punto de tesis elegido.*
- III.—*Biotipología en general. Biotipos de Kretschmer; su teoría y método de estudio.*
- IV.—*Presentación de los casos clínicos.*
- V.—*Conclusiones.*

Capítulo Primero

Antropología Antigua y Moderna.º

Definición.º Sus relaciones con
otras ramas de la Medicina.

La Antropología es una palabra de antiguo conocida, su significado ha sido siempre el estudio del hombre. Antes comprendía únicamente el estudio moral, posteriormente el de su parte física, hasta llegar a comprender el estudio de ambas. Ya Aristóteles, en su época, llamaba antropólogos a todos aquellos que se ocupaban de disertar sobre el hombre.

La palabra Antropología se encuentra usada por primera vez en el año de 1501 en una obra de Magnus Hunt; luego fué empleada como sinónimo de "descripción del alma" o "descripción del cuerpo y del alma y de las leyes que presiden tal unión". Diderot y Alembert la definieron el año 1772 como "Tratado sobre el hombre"; en 1778, se publicó una obra de psicología titulada "Ensayo Sobre Antropología"; pero hasta la época de Blumembach, fué tomada en el sentido en que hoy la entendemos. Conforme ha ido pasando el tiempo, esta rama del saber se ha transformado hasta llegar a convertirse en una entidad científica. El año de 1883, Serres es nombrado profesor Titular de Antropología o de Historia Natural del hombre, y en el año de 1889 W. Edwards, comprende en la denominación en Antropología "el conocimiento del hombre desde el punto de vista físico y moral."

Hallamos aún la palabra Antropología usada en sentido que se desvía o si se quiere se separa de su verdadera acepción; como es el caso de que varios médicos la emplean como título de verdaderas enciclopedias, que abarcan a la vez la Anatomía, la Fisiología, la Patología y la Higiene. El profesor Carlos Schmidt, a un capítulo de sus cartas antropológicas que fueron escritas en el año de 1852, le puso por epígrafe "Antropología del Nuevo Testamento"; en la "Revista de Ambos Mundos", un autor la empleaba como sinónimo de "reproducción de la figura humana en los vasos griegos", y así se podrían poner otros múltiples ejemplos de los usos y significados que se le ha dado a este vocablo.

Actualmente la palabra Antropología tiene sentido preciso sin que ninguna otra pueda sustituirla, ya que significa una ciencia completamente definida como cualquiera otra.

Sin embargo, creo conveniente pasar en revista las principales definiciones y conceptos que acerca del particular se han dado. El libro de Antropología del Dr. Pablo Topinard expresa: "La Antropología es

la parte de la Historia Natural que trata del hombre y de las razas humanas. Es la definición más aceptada en la actualidad.

W Edwards expresa: "el hombre en su totalidad es decir por los conceptos físico y moral, pertenece a la Antropología."

Broca la define: "Como la ciencia que tiene por objeto el estudio del grupo humano, considerado en su conjunto, en sus detalles y en sus relaciones con el resto de la naturaleza".

Bertillon dice: "Que es una ciencia pura y concreta que tiene por objeto el conocimiento del grupo humano considerado, primero en cada una de las cuatro divisiones típicas (variedad, raza, especie si hay lugar) comparadas entre sí y con su respectivo medio ambiente; segundo, en su conjunto y en sus relaciones con el resto de la fauna".

Quatrefages en su definición señala que: "La Antropología es la historia natural del hombre, desde el punto de vista monográfico, como la entendería un zoólogo que estudiase un animal". Con lo anterior se deja aclarado la connotación del término Antropología.

En cuanto a su programa, podemos decir que es amplísimo, pues comprende todos los puntos de vista en que ha de colocarse el naturalista cuando quiere trazar la historia completa de una especie animal y de sus variedades; por lo tanto el estudio del antropólogo está calcado de éste último; sus fines son idénticos, le es necesario, obligatorio proceder del mismo modo, pero su estudio es doble, por que ha de examinar: primero al hombre, considerado en su conjunto, mientras se le tome por grupo y del cual ha de conocer las diferencias y las analogías con los más inmediatos semejantes en la clase de los mamíferos, y segundo las variedades humanas que se llaman razas, palabra que no prejuzga nada en relación al rango jerárquico que se le haya de asignar más tarde.

Los datos y caracteres que preocupan al naturalista son los que reclaman la atención del antropólogo. Estos caracteres pueden dividirse en cuatro, como principales; primero, los caracteres físicos estudiados en unos en el cadáver y los otros en el ser vivo; segundo, los caracteres fisiológicos, que toman un nombre particular cuando se trata del cerebro: el de facultades, fenómenos o procesos mentales; tercero, los caracteres engendrados por el estado social; y cuarto, los caracteres o mejor dicho, los datos históricos, arqueológicos, lingüísticos, etc., etc.

En cuanto al método éste, es idéntico para el hombre y para los animales y así como en la historia de éstos (esto es tratándose de Zoología) su estudio no puede dividirse, encargando a unos lo relativo a los caracteres anatómicos y fisiológicos referentes a determinados órganos y a otros lo concerniente al resto del cuerpo y al sistema nervioso, en el estudio del hombre no puede mutilarse. También la organización del hombre en general, como la del resto de los animales, sencilla o complicada, se encuentra sujeta a las mismas leyes, puesto que se compone de los mismos elementos y funcionan en igual manera.

Las manifestaciones psíquicas así como el volumen y la calidad

del cerebro son lo único que verdaderamente señalan la distinción entre el hombre y los animales.

La Antropología, según las consideraciones hechas, tiene un amplísimo campo de estudio, de tal modo que Jaime Junt, dice es "la ciencia del hombre y de la humanidad" o Broca, que es "la biología del género humano".

Abarca en este campo de acción, como ciencias más inmediatas, la Anatomía y la Morfología comparadas, tanto del hombre como de los animales; la historia de los animales y de una manera especial de los mamíferos sobre todo de los monos antropoides; de las diversas ramas de las ciencias médicas, toma muy en particular la Fisiología, de la cual forma parte la Psicología Normal y Patológica; luego todo cuanto se refiere a los pueblos, a la Etnografía, a la Geografía, a la Historia y a la Lingüística y por último a la Arqueología Prehistórica; y además la ciencia del derecho, las artes y la literatura le dan un contingente muy importante. Como ejemplo de su trascendencia enuncio las siguientes apreciaciones: León Guillard, abogado y antropólogo, muerto en Buzenval, demostró ocho meses antes de su fallecimiento, el gran partido que la Antropología podría tomar de la ciencia del derecho comparado, tesis que fué continuada más tarde por Acallas en el año de 1874. En el año anterior M. César Doly, consignó, ante la Sociedad de Antropología, que la Arquitectura, en sus partes elementales, varía con el genio de cada raza. Fetis en 1867, propuso que se hiciese una clasificación de las razas, que tuviera como base fundamental los sistemas musicales, las danzas, los cantos, los poemas nacionales y las mitologías, lo cual contribuiría también a trazarnos sus afinidades y sus orígenes.

Los primeros ensayos de Antropometría, para conocer las proporciones del cuerpo humano, y la Craneometría, para analizar la fisonomía, débense a varios artistas.

La descripción particular y la determinación de las razas, el estudio de sus semejanzas y de sus diferencias, tanto desde el punto de vista de la constitución física como del estado intelectual y social; la investigación de sus afinidades actuales, su distribución en el presente y en el pasado, su importancia histórica, su parentesco más o menos dudoso o probable y su posición respectiva en la serie humana, es la parte de la Antropología, que se designa con el nombre de Etnología; igualmente toma datos de la Etnografía o descripción de los pueblos. La Antropología y la Etnología, para nosotros, son dos partes distintas del estudio del hombre, que se prestan mutuo apoyo. La Antropología estudia con los mismos procedimientos al hombre y a las razas humanas; la Etnología solo conviene a los pueblos y a las tribus, tales como la Geografía y la Historia.

La Etnología, comprende dos partes: la Etnografía que describe en particular cada pueblo, sus usos, sus costumbres, religiones, lenguas, caracteres físicos y orígenes en la Historia, y la Etnología propiamente

dicha que se ocupa de la misma cuestión, desde el punto de vista general aplicándose a todos o a varios pueblos.

La Antropología no es una ciencia de lujo como pretenden que se tome; es una ciencia que promete las más interesantes aplicaciones y difunde una nueva luz en todas las ciencias que sean afines al hombre.

Sabido es que el estudio de la naturaleza y del ser humano en particular, remonta a los primeros ensayos del espíritu humano; pero en cuanto a Antropología, como ciencia especial separada de la historia natural, solo data de ayer. Todavía a fines del siglo XVIII, se encontraba sumamente abandonada, no fué sino a mediados del XIX cuando tomó verdadero impulso. Los primeros médicos que se ocuparon en la Antropología fueron: Hipócrates, que en su libro estudiaba y consideraba las aguas, los aires, las localidades, las características de los escitas y de otros nómadas y tomaba igualmente en consideración las deformaciones craneanas de los macrocéfalos. Aristóteles, que comparaba a los monos con el hombre y se ocupaba de los mestizos humanos y de los etíopes. Galeno, que diseccionaba los monos y preparaba el terreno de la Anatomía Humana; Mundius y los Vesale que por el año de 1514, también disertaban sobre lo mismo, y los filósofos que se ocuparon de ello, aunque de sus estudios no tomó gran ventaja esta ciencia.

Bellon, en el año de 1655, fué el primero en establecer, el paralelo que existía entre el esqueleto del hombre y el de otro animal, el de una ave. En 1749 Buffon, consagró dos volúmenes a las variedades humanas. Todos estos sabios preparaban el terreno, puede decirse, de manera simultánea. Posteriormente Daubenton, publicaba una memoria en la cual señalaba "la posición del agujero occipital en el hombre y en los animales"; Blumenbach, en 1775 en su tesis inaugural, considera "las variaciones del género humano"; Soemering, en 1785 publica una memoria "sobre los negros"; Camper, en 1761 en su disertación póstuma, hace alusión "sobre las diferencias que presenta el rostro de las razas humanas"; y White, en 1799, escribe un trabajo sobre "la gradación regular del hombre y de los animales".

Como por esta época se encontraban de moda los grandes viajes, afluían multitud de noticias sobre las razas lejanas; por tierra facilitaron estos datos Byron, Bruce, Levaillant, Pallas y Barrow, por mar Benjamin Franklin, Cook, La Perouse y Peron.

Con todas estas controversias en las ideas la escuela Clásica se consagró y era designada entonces con el nombre de Monogenista, pues abogaba en favor de la unidad de la especie humana y de la variabilidad de las razas bajo la influencia de las localidades y de los cruzamientos. La escuela contraria o Poligenista, apoyaba la pluralidad de las razas y negaba la influencia de los lugares.

En Francia, Cuvier era el gran nombre a cuya sombra se escudaba la primera escuela, y Virey, Bory de Saint-Vincent y Demoullins, eran partidarios de la segunda; pero en el año de 1831, Prichard se batía en

el extranjero en defensa de los Monogenistas, publicando una de las obras más interesantes de esa época: "Investigaciones en la Física del Hombre".

Posteriores a ésta obra, se publicaron otras, como son: en el año de 1817, "El Modelo de la Historia Natural del Hombre", de Virey y otra de Lawrence; obras que ponían de relieve la influencia que comenzaba a hacer sentir la Antropología en diferentes partes del mundo.

Coincidiendo con ésta época ya se encontraban establecidas sociedades antropológicas en relación con la Etnografía; la primera que se fundó de esa naturaleza estaba en París y se denominaba "Sociedad de los Observadores del hombre" año de 1800; la segunda se fundó en Londres, en 1838, con un punto de vista filantrópico. Esta sociedad en sus investigaciones declaró que los negros eran inferiores a los blancos, habiéndose valido de ese argumento para establecer la esclavitud; pero la sociedad esa no duró más de un año, pues al siguiente, W. Edwards escribió en esta época importante trabajo "Sobre los caracteres fisiológicos de las razas humanas consideradas en sus relaciones con la historia". Teniendo como base el mismo orden de ideas se publicaron otros trabajos en Francia y en otros países, entre los cuales citaremos el de Alcides de Orbigny, que titulaba "El Hombre Americano".

A pesar de todos estos adelantos y de la importancia que iba adquiriendo la Antropología, no lograba una completa independencia, no podía a pesar de todos sus esfuerzos consagrarse como ciencia distinta. Fué hasta la fundación de la Sociedad Antropológica de París, en el año de 1859, cuando su actuación como ciencia hizo sentirse, no solamente en Francia sino en otras partes. La Sociedad fué fundada a iniciativa de un profesor de la Facultad de Medicina de París, el doctor Pablo Broca, alrededor del cual colaboraban eficazmente un grupo de sabios, entre los cuales figuraban Isidro Geoffroy Saint-Hilaire, Quatrefages, Gratiolet, Dareste, Ernesto Godard, Carlos Robín, Beclard y otros. Esta sociedad estaba garantizada de una manera particular porque todos sus esfuerzos eran vistos a través de un espíritu muy liberal, hecho que daba estímulo a otros investigadores, ya no de Francia sino de otros países, para que fundaran sociedades, que además de tomar las mismas denominaciones colaboraran eficazmente con la de París. Así en el año de 1863, se fundó la Sociedad de Antropología de Londres, en 1865 las Sociedades de New York, de San Petersburgo y Moscov, en 1866 la de Manchester, en 1868 la de Florencia, en 1869 la de Berlín, en 1870 la de Viena y en 1874 la de Estocolmo y la de Tifis.

En la época de la fundación de la Sociedad de Antropología de París, se presentaron acontecimientos de gran importancia, como la confirmación pública del descubrimiento de Boucher y de Pethes, que hacían remontar a época incalculable la antigüedad del hombre, y la publicación de la obra de Darwin sobre el "Origen de las Especies".

Habiendo considerado brevemente la Historia de la Antropología, y habiendo llegado al límite o frontera si se me permite la expresión,

de la Antropología Antigua y la Antropología Moderna, es necesario enumerar aunque sea someramente las ideas que prevalecían en la mente de los sabios de esa época.

Por este tiempo, Lamarck, fundaba y desarrollaba el transformismo en Francia.

"La especie humana, escribía Lamarck en el año de 1809, varía hasta el infinito, y considerada en el tiempo no existe. Las especies pasan de una a otra por afinidad de transiciones así en el reino animal como en el vegetal; nacen por vía de transformación o de divergencia. Remontando la serie de los seres, llégase así a un corto número de gérmenes primordiales o mónadas, que provienen de generación espontánea. El hombre no se exceptúa, es el resultado de la transformación lenta de ciertos monos. La escala con que se comparaban antes los reinos orgánicos no existe, sino para las masas principales. Las especies por el contrario, son como las extremidades aisladas de las ramas, que forman cada una de dichas masas. Las vías y medios de Lamarck, se resumen en una frase: "La adaptación de los órganos a las condiciones de la existencia". El cambio en las circunstancias exteriores, obliga al animal, pues to en presencia de otros más fuertes o de nuevas condiciones de vida, a contraer costumbres distintas, que producen exceso de actividad en ciertos órganos o falta de ejercicio en otros. En virtud de la ley fisiológica inherente a todo organismo, de que el órgano o cierta parte de él disminuye o aumenta en proporción a su trabajo, estos órganos llegan a modificarse, adaptándose al fin a nuevas condiciones. Esta teoría no fué aceptada, por que Lamarck se adelantó a su época y no siendo comprendido cayó por tierra, ya que prevalecían sobre ella los conceptos de Cuvier, que contaba con el apoyo del Gobierno Francés, así como por el de todos aquellos que eran partidarios de las ideas ortodoxas".

En el año de 1859, apareció en escena el gran naturalista Carlos Darwin, que escribió sus ideas originales durante un viaje alrededor del mundo en el Beagle. De regreso a Londres, seis años después, estudió los resultados obtenidos por los que se dedican a la cría de animales e hizo por sí mismo varios experimentos, particularmente en las palomas. La selección particular le preocupaba mucho, cuando un día cayó en sus manos el libro titulado "Población de Malthus". Esto fué para él un rayo de luz, había encontrado la palabra que debía dar vida a su teoría "La lucha por la vida".

Por una singular casualidad otro sabio inglés, Ricardo Wallace, que habitaba en Malacia, dirigíale en aquel entonces una memoria fundada en hechos, en la cual se vertían las mismas ideas; pero Wallace, apenas hubo comenzado a tratar el asunto, retrocedió ante las consecuencias de sus trabajos, cuando comprendió que dichas ideas eran forzosamente aplicadas al hombre. Darwin, por el contrario, avanzó hasta el final y con justa razón dieron sus compatriotas a su teoría el nombre de Darwinismo, teoría que se define así: "La Selección Natural en la Lucha por la Existencia, Aplicada al Transformismo de Lamarck".

Antropología Moderna.- César Lombroso y la Antropología Criminal.- Principios Antropológicos de la Higiene Moral.

Corresponde a Italia el mérito de haber sacado a la Antropología del estancamiento en que se encontraba. Hacia el año de 1855 César Lombroso aplicó el método Antropológico al estudio de los locos y posteriormente al de los criminales. La observación y la medida de los sujetos clínicos se hacía muy particularmente en el cráneo con los métodos de la Antropometría, e hicieron descubrir a César Lombroso que la perturbación psíquica de los dementes iba acompañada de desórdenes morfológicos y físicos que eran testigos de alteración profunda y congénita de toda la personalidad. Por tal motivo el diagnóstico adquirió para Lombroso una base somática. Análogos resultados condujéronle al estudio antropológico de los criminales.

El método aplicado se asemejaba en todo al que la Antropología había tomado de la Zoología, esto es, la descripción del individuo principalmente considerado en su personalidad somática y secundariamente en la fisiológica y en la psíquica, el estudio de sus reacciones con el medio ambiente, su conducta, sus usos, sus costumbres, el agrupamiento de los sujetos según su carácter predominante en tipos, constituyéndose en clasificación; y en fin el estudio de los orígenes que se constituía en la investigación social sobre la génesis de tipos degenerados o anormales. Las doctrinas de Lombroso, tomaron gran incremento, pues sabido es que los criminales presentan anomalías de forma, desviaciones morfológicas que se unen a la degeneración y que se reconocen con el nombre de estigmas, actualmente vicios de conformación, que reunidos en determinado individuo, le dan una característica especial. Junto con el cuadro somático, Lombroso, delineó de manera magistral un cuadro fisiopatológico de los sujetos criminales, después de haber estudiado la sensibilidad, las ideas, los sentimientos ético-sociales, el tatuaje, la escritura y las producciones literarias. Lombroso señaló en su obra "El hombre Delincuente", varios tipos: como el loco moral, el delincuente epiléptico, el delincuente de ímpetu o de pasión, (fuerza irresistible), el delincuente loco y el delincuente ocasional. Clasificaba una serie de sub-especies, podríamos decir, que salían del cuadro somático y psico-moral de los individuos anormales; pero el fondo biopatológico común de estos individuos a excepción hecha del último, era la degeneración. Puede decirse con Morselli, que César Lombroso en toda su doctrina ha completado y ampliado a Morel, cuya obra titulada "Tratado de la Degeneración de la Especie Humana", salió a luz en Francia cuando aún Lombroso comenzaba sus investigaciones antropológicas. Estos dos grandes maestros tomaron como base de su doctrina el concepto naturalístico del hombre, agregando a éste el proceso de sus anomalías y prevenciones y el factor mesológico del ambiente. Morel, considera las causas sociales de la degeneración, esto es

la miseria orgánica progresiva en la descendencia, por encima del fenómeno individual; esas causas que obran sobre la posteridad y tienden a procrear una variedad humana que la desvía de sus caracteres de la línea normal, pueden resumirse "en el alcoholismo, los envenenamientos ocasionados por las profesiones industriales (venenos metálicos, o ligados con la denutrición, pelagra), las condiciones endémicas del terreno (cretinismo), las enfermedades infecciosas (malaria, tuberculosis) y desasimilación (surmenaje)."

Aquiles De Giovanni y la Antropología Fisiológica.- Algunos Principios antropológicos de la Higiene Física

En la facultad de Medicina de Padua, De Giovanni, ha introducido el método antropológico en el exámen clínico del enfermo. Pero mientras Lombroso miraba como puntos de partida los vicios de conformación, relacionándolos con hechos degenerativos, De Giovanni, ponía en sus investigaciones una base francamente fisiológica; consideraba al individuo humano en su totalidad como organismo funcionante, y miraba las proporciones inarmónicas como predisposición necesaria a ciertas morbosis. Procediendo de esta manera, tomaba como referencias generales el desarrollo entre el tronco, que contiene los órganos esenciales, que rigen la vida vegetativa y de relación y las extremidades, y por la morfología externa del tronco, determinada con las mediciones, establecía mutuas referencias de desarrollo entre las cavidades viscerales; decía, que las "proporciones del cuerpo humano dependen del desarrollo de sus órganos; y de la misma manera que las proporciones del conjunto de los órganos nace el valor fisiológico del cuerpo". La obra de De Giovanni, plantea una doctrina acerca de los temperamentos y las predisposiciones morbosas que tienden actualmente a remover las bases de la medicina, llevándola del estudio de las enfermedades al de los individuos enfermos, y que renuevan modernamente los antiguos conceptos de la medicina griega que desde los tiempos de Hipócrates y de Galeno, trazaban cuadros de tipos fisiológicos fundamentales. A los antiguos temperamentos, nervioso, sanguíneo, bilioso y linfático, substituye tipos morfológicos casi correspondientes, en los cuales predominan las enfermedades cardíacas, las neurastenias, las enfermedades hepáticas y la tuberculosis.

El asunto más importante de las doctrinas de De Giovanni es indudablemente aquella que nos induce a considerar el desarrollo ontogénico con relación a las anomalías de la personalidad fisio-morfológica. Opina él, que "en todas las épocas de la vida es aplicable el principio de que en la especial morfología del organismo se haya la razón de una enfermedad determinada. El individuo se transforma incensantemente y por lo tanto puede ofrecer en las diversas épocas de su vida diferentes enfermedades."

José Sergui y la Antropología Pedagógica

En el año de 1888, el ilustre Maestro José Sergui, sostuvo el principio de que al niño escolar debía estudiársele con los métodos dictados por la Antropología. Este autor opina que el verdadero campo práctico en que las ideas pueden en gran parte realizarse, es en la escuela. Su principio reposa sobre esta base indiscutible: "Para educar es preciso, indispensable, necesario, conocer al educando". Medir su cabeza, la estatura, etc., (es decir aplicar el método antropológico), no es hacer pedagogía, dice el Maestro Sergui, cuando habla de la contribución que a esa disciplina prestaron en el siglo décimonono, las ciencias biológicas, por que no se puede educar a nadie, si no se le conoce directamente.

Así en las "Orientaciones Modernas de la Antropología," del libro de Montessori, del cual he tomado parte, encontramos esta opinión: "entre los tipos que será pedagógicamente interesante buscar en los escolares, deberán ser preferidos sin disputa los que corresponden a la infancia de los individuos anormales ya estudiados en la "Antropología Criminal" de Lombroso, o en la "Morfología Clínica" de De Giovanni. El hombre se transforma creciendo; el cuerpo no sólo aumenta de volumen sino que evoluciona profundamente en la armonía de los miembros y en la constitución de los tejidos; de modo que la personalidad psíquica no crece, sino que evoluciona, como la predisposición al morbo varía a través de las épocas del individuo patológico. Para los tipos anormales que se agrupan hoy bajo la denominación de deficientes, para los patológicos que se revelan escrofulosos o raquíticos, son indispensables escuelas y métodos especiales de educación."

"Si la antropología criminal ha podido en la sociedad moderna transformar una pena, debemos proponernos en la escuela futura transformar un individuo. Lo que importa es conocer a la humanidad normal para guiarla sabiamente con el fin de que alcance el progreso de esa misma humanidad."

Detalle de Medidas

Estas medidas han sido tomadas según la Convención Internacional de Ginebra.

Principios generales.—Se adoptarán:

- a).—Para la medidas en el vivo, la posición de pie.
- b).—El método de las proyecciones, salvo en los casos que con advertencia previa se use un método diferente.
- c).—Para las medidas pares, se recomienda elegir el lado izquierdo; así como tomar las medidas bilaterales, para la altura del acromion y del gran trocánter, encima del suelo.
- d).—Se ruega a los observadores indiquen siempre con precisión su método y su instrumentación.

e).—Se recomienda de especial manera a las personas deseosas de practicar la Antropometría, no contentarse con un estudio técnico de los procedimientos de medicina, sino aprenderlos prácticamente en los diversos laboratorios donde sean instruidas.

Detalle de medidas:

Peso.—Tomado en básculas y expresado en kilogramos.

Estatura.—Para tomar esta medida se procede colocando al sujeto sobre un plano firme y horizontal sin apoyarse en ningún plano vertical, con los miembros superiores pendientes, las palmas de las manos vueltas hacia adentro, los dedos apuntando verticalmente, los talones juntos y la mirada en dirección horizontal. En esta posición deberá siempre medirse la altura del vértice sobre el nivel del suelo.

Busto sentado.—(Estatura parcial).—Se coloca al sujeto sentado sobre un banco firme y horizontal de veinte a cuarenta centímetros de altura, (el que usamos nosotros fué de cuarenta centímetros) con las rodillas dobladas, la cara dorsal del busto en contacto por dos puntos con un plano vertical o en su defecto con un antropómetro, que corresponda respectivamente a la región sacra y a la región media de los omoplatos. La línea visual horizontal; en estas condiciones se mide la altura del vértice sobre el nivel de la superficie del banco.

Diámetro biacromial.—(Anchura de hombros).—Es la distancia máxima entre ambos puntos acromiales. El punto anatómico exacto es: el borde superior y externo del acromion.

Circunferencia torácica.—Esta circunferencia deberá medirse sobre el plano horizontal, pasando por la base del cartilago ensiforme. Anotaremos igualmente la medida de las mediciones tomadas en inspiración y espiración respectivamente.

Circunferencia abdominal.—Deberá tomarse al nivel de la porción más estrecha del abdomen.

Perímetro pélvico.—Se mide tomando como referencias las señaladas para la pelvimetría externa.

Circunferencia máxima del antebrazo.—Se tomará esta medida en la región de los músculos epitrocleanos, epicondíleos, y extensores, esto es, inmediatamente abajo del nivel de unión.

Circunferencia de las manos.—(Contorno de la mano).—Se coloca la mano derecha sobre una hoja de papel, con los dedos ligeramente separados y el eje del dedo medio, como prolongación del eje del antebrazo. Se marcan con puntos, por medio de un lápiz los extremos de la línea bi-estiloidea. Partiendo de estos puntos se traza con lápiz el contorno de la palma de la mano y de los dedos, pasándolo a lo largo y teniendo verticalmente. Se señalan otros puntos especiales, marcando (a) los extremos de los espacios inter-digitales y (b) a cada lado, la posición de las articulaciones metacarpo-falangianas.

Circunferencia de la pierna.—(Circunferencia de la pantorrilla).—Al nivel de la circunferencia máxima de los músculos de esta región

Braza.—Es la distancia horizontal de la punta del dedo medio

de una mano a la punta del dedo medio de la otra, con la extensión máxima de los brazos, siempre los dos brazos a la misma altura.

Mediciones de la cabeza.—Longitud máxima.—Este es el diámetro máximo glabelo-occipital de la bóveda craneana. Se toma con el compás (de espesor de Broca o Hrdlicka), éste último fué el usado por nosotros. Se toman como puntos anatómicos el punto más prominente de la glabella adelante, y el punto más prominente sobre el occipucio atrás.

Anchura máxima.—Diámetro transversal máximo, que se toma con el compás (en este caso lo tomamos con el compás de Hrdlicka). Como puntos anatómicos, determinables, únicamente por la anchura máxima del cráneo sobre las apófisis supra-mastoideas y crestas zigomáticas.

Mediciones de la cara.—Únicamente daremos definición de los puntos anatómicos a que nos vamos a referir.

El nasio.—Este punto se encuentra situado siempre arriba de una línea horizontal que conectase los dos ángulos internos de los ojos.

El crinio.—Es el punto medio de la línea del pelo, en donde esta forma un arco regular. Ocasionalmente una extensión del pelo más o menos en forma de V, hacia abajo sobre el plano medio, marcará este arco y en este caso será necesario extender las partes laterales del arco hasta conectarias y marcar el crinio a la mitad de esta línea.

Longitud mento-nasio.—Es la distancia del mentón (el punto más bajo en la parte media del mentón óseo) al nasio. Poniendo el maxilar en su lugar.

Longitud mento-crinio.—Es la distancia del mentón, la misma relación anatómica señalada anteriormente, únicamente que la rama del compás en lugar de estar en relación con el nasio, se relaciona con el crinio.

Anchura de la cara.—(Diámetro bizigomático máximo).—Es la distancia tomada sobre la cara externa de los arcos zigomáticos.

Anchura frontal mínima.—La anchura frontal mínima, es el diámetro horizontal más corto entre ambas apófisis temporales sobre el hueso frontal.

Altura de la frente.—(Altura nasio-crinio).—La altura de la frente resulta de la diferencia entre los diámetros mento-nasio y mento-crinio. Todas estas medidas fueron tomadas con el compás de espesor de Hrdlicka.

Mediciones de la nariz, de la boca y de las orejas.—Nariz.—Longitud.—La longitud o altura de la nariz, se toma desde el punto de unión del tabique nasal y el labio superior hasta el nasio. Se toma generalmente con el compás de corredera; así la tomamos nosotros.

La anchura de la nariz.—La anchura máxima normal externa de las alas de la nariz, se determina sin ejercer presión alguna. Se tomó igualmente con el compás de corredera.

Anchura de la boca.—La distancia que media entre los ángulos

de la boca en los puntos en que la membrana mucosa se une a la epidermis, teniendo ésta cerrada con naturalidad y sin tensión.

Oreja.—Longitud máxima.—Se toma como referencia, el punto más elevado sobre el hélix, al punto más bajo del lóbulo.

Anchura máxima.—Es la distancia entre dos líneas paralelas al eje máximo de la oreja; una de dichas líneas siendo tangente al borde anterior del hélix y la otra al borde posterior. (Ambas medidas fueron tomadas con el compás de corredera.)

Capítulo Segundo

Breves consideraciones sobre las secreciones internas y los órganos de que provienen. Las influencias hormonicas. La Constitución. El Temperamento y el Carácter.

Cuando una substancia que toma su origen en un órgano o tejido, pasa posteriormente a la sangre o a la linfa, se le denomina producto de secreción interna, y correlativamente al órgano o tejido de que procede se le llama órgano endócrino o de secreción interna, entendiéndose también al que fabrica, en el interior de sus células una substancia química, siempre la misma, específica y que pasa a la sangre no importa por qué mecanismo. Lo interesante en la doctrina de las secreciones internas, es que la substancia segregada permanece en el interior del organismo y circula con la sangre. Consideramos secreción externa, aquella cuya naturaleza la hace entrar en la clase de los fermentos o enzimas, y cuyos modos de obrar son conocidos del biólogo; no únicamente se las encuentra en las secreciones, sino también en el bioplasma celular, que es el que les da origen. La actividad química de la célula depende en gran parte del contenido en enzimas. La naturaleza de los enzimas, aún no está perfectamente dilucidada, pero se supone que sean de naturaleza proteica, y que se destruyan rápidamente por el calentamiento en presencia del agua. No sucede lo mismo cuando se trata de los principios activos de un órgano de secreción interna, porque estos principios soportan la ebullición prolongada y su constitución es probablemente más sencilla: estos principios son dializables y no ha sido posible obtenerlos libres de impurezas. Nuestros conocimientos a este respecto se reducen a uno sólo y que actualmente se obtiene por procedimientos sintéticos, la **adrenalina**. El modo de acción de estos productos se asemeja a la de los medicamentos y sobre todo a los de origen vegetal; obran por acción química, llevados en solución por la sangre, al lugar que debe ser por ellos influenciado, y su acción es rápida y violenta y existen otros cuyo modo de acción es lento, necesitando más o menos tiempo para hacer notar sus resultados; su efecto es siempre el mismo en cualquier organismo en que se encuentren.

Estas substancias unas veces estimulan las funciones celulares y otras, por el contrario las deprimen. Ejemplo de las primeras es el ácido clorhídrico sobre el epitelio duodenal, y de las segundas la inyección intravenosa de extracto de placenta, que detiene la secreción láctea. Por tanto, teniendo en cuenta esta manera de obrar de tales productos se les ha denominado según su acción sobre las funciones; a las que estimulan se les designa con el nombre de "Hormonas" y a las

que producen el efecto contrario, es decir, depresión o supresión funcional, se les llama "Calonas."

Sir. Edwards Sharpey Schafer, profesor de la Universidad de Edimburgo, propuso que tales principios activos se les diera la denominación de substancia autocoidea, que significa substancia específica orgánica formada por las células de un órgano e incorporada posteriormente a la sangre, para producir sobre estos órganos efectos parecidos a los medicamentos. Si estos efectos son en el sentido de una excitación, se habla de substancia autocoide excitante, y si no de substancia autocoide inhibidora. Como se ve, la acción de un autocoide puede ser "Hormónica" o "Calónica."

También debemos considerar que los productos de secreción interna o autocoides de Schafer, no se manifiestan en el mismo sentido y para la misma secreción, porque éstas en ocasiones pueden poner de manifiesto una acción hormónica y en otras una acción calónica. A esto se da la interpretación siguiente: la secreción obra sobre el sistema nervioso poniendo en juego tanto sus fibras de acción excitadora como las de acción depresora con predominio de una de ellas, pues el sistema nervioso es el regulador de todos nuestros actos y funciones.

Las principales glándulas endócrinas son: el tiroides, el timo, la hipófisis o cuerpo pituitario, las cápsulas suprarrenales, las paratiroides. Además de la función endócrina de varias vísceras como el páncreas, el hígado, el intestino, etc.

Estas glándulas han sido clasificadas por Gley en:

I.—Glándulas nutritivas.

II.—Glándulas que sirven para mantener la composición del medio interior.

III.—Glándulas reguladoras y excitantes de funciones.

IV.—Organos no glandulares, pero que hacen el papel de glándulas endócrinas.

Cuáles son las causas que alteran el funcionamiento armónico del conjunto glandular antes mencionado

Como factor de primer orden en el funcionamiento de las glándulas de secreción interna tenemos la alimentación, con la cual existe relación clara y precisa en lo que al anabolismo y catabolismo se refiere. Toman particular papel en las enfermedades por carencia como las avitaminosis. Las infecciones, los estados tóxicos, los traumatismos físicos y psíquicos, son causas comunes y frecuentes, que alteran el funcionamiento glandular armónico de las glándulas antes mencionadas, e influyen también las predisposiciones constitucionales individuales; la edad, el sexo, etc. En otras ocasiones el primer brote de enfermedad se localiza en la glándula misma desde su principio (enfermedad primitivamente glandular).

Las alteraciones de las glándulas se manifiestan por hiper, por hipo o por disfuncionamiento.

Hecha esta breve exposición de lo que debemos entender por glándula de secreción interna, diremos partiendo de este punto de vista, las consideraciones que prevalecen como teorías en la formación de la constitución y el carácter, ya que están rubricadas por sabios que han dedicado su vida a la investigación de tales asuntos.

Ya desde Hipócrates, se precisaban cuatro temperamentos, que se relacionaban íntimamente con los cuatro elementos (frío, en el aire; caliente, en la tierra; húmedo, en el agua; y seco, en el fuego).

Galeno, creó el sanguíneo (cálido y húmedo) y el bilioso (cálido y seco), y habló de dos substancias imaginarias, la atrabilis, cuyo exceso en el organismo produciría el temperamento melancólico y la pituita cuya abundancia en él daría nacimiento al temperamento pituitoso; posteriormente añadió el temperamento linfático (húmedo y frío). De estas notas se desprenden nociones importantes, como son según Mac Auliffe, la de la individualidad: cada individuo reacciona según un temperamento que le es propio (Hipócrates); la acción del medio sobre el individuo hombre (las aguas, los aires, los lugares); las de las reacciones del hombre sobre los medios (Hipócrates).

En nuestros días se acoplan para tener noción de la personalidad los conceptos de constitución (dominio de una especial desproporción morfológica en el equilibrio morfológico general) y de temperamento (nota psico-fisiológica dominante en determinado individuo, por preponderancia o defecto de una función o de un estado humoral en el equilibrio dinámico general). La constitución es la resultante fisiológica y psicológica, que es variable de un individuo a otro, de las propiedades de todos los elementos humorales y celulares del cuerpo, como también de la combinación especial en el organismo de una determinada capacidad de adaptación y de la manera de reaccionar a los estímulos del ambiente. Esta resultante está directamente relacionada con las leyes de la herencia, por las acciones perturbadoras ejercidas por el ambiente sobre la organización del individuo. La constitución representa la faz dinámico-humoral del temperamento.

El modo y la proporción en que se hacen los cambios físico-químicos en el organismo es lo que produce el temperamento. Es necesario que se distinga de la constitución, es decir, de las variaciones individuales en la arquitectura y armazón del cuerpo, en el volumen y en el peso, en la proporción y adaptación de los órganos, la cual se refiere a la estructura del organismo y al equilibrio de sus partes, es la característica estática del individuo. El temperamento se integra por las variaciones individuales en la actividad del organismo, es la característica dinámica de un individuo. Para la división de los temperamentos hay que tener en consideración la relación que existe entre la integración y la desintegración en el organismo en general y en el sistema nervioso en particular. Así tendremos: temperamento de ahorro,

con predominio de la integración, y de gasto con predominio de la desintegración, dando por resultado que los antiguos tipos creados anteriormente, como son el sensitivo y el activo serían iguales, porque la función sensorial favorece la integración y la activa la desintegración.

Vidoni y Kobylinsky, al determinar la noción de constitución en psiquiatría, se apoyan en los conceptos endócrinos según las investigaciones de Abderhalden. No es posible construir científicamente esta noción si no se valorizan las correlaciones funcionales de las diversas glándulas. Es por ellas que en la doctrina hormonal, encuentra la teoría constitucionalista su natural aliada. Este principio domina en el concepto de la constitución. Las varias combinaciones en los órganos de los líquidos orgánicos, las relaciones anatómicas y funcionales entre las distintas partes del cuerpo, determinan las diferentes constituciones físicas y morales, que se modifican y precisan según los caracteres dominantes en el equilibrio inter-orgánico.

Es muy antigua la idea de que los humores, dice Lugaro, desempeñan papel preponderante como elementos de la constitución individual y son por lo tanto factores del carácter. En el lenguaje general, humor significa a la vez fluido orgánico y disposición afectiva. Los progresos de la anatomía dan más importancia a las partes sólidas y figuradas del organismo que a los líquidos que contienen. La psicología ha sufrido la influencia de lo sólido o mejor dicho de la anatomía, cuando una importancia preponderante al sistema nervioso, pero debemos tomar en consideración que las estructuras no lo precisan todo, cuando menos todavía no se encuentran las relaciones exactas, como por ejemplo entre las psicosis afectivas y las psicosis circulares, que confieren a un individuo dos caracteres opuestos, uno alegre y otro melancólico alternativamente, ni nos explica que en un mismo sujeto, una inteligencia clara se asocie a una insensibilidad moral. En el mecanismo psico-fisiológico hay algo que procede no de la anatomía, sino de la química; no de la estructura, sino de la composición de los humores. Es así que de las glándulas de secreción interna depende el tipo somático individual en la pubertad, en la madurez viril o femenina, en la menopausia y en la vejez.

Igualmente las secreciones internas establecen diferencias fisiológicas, intelectuales y afectivas entre los dos sexos.

El experimento de Pezard y de Steinnach, prueban que las influencias hormonales de los órganos de uno o de otro sexo despiertan los respectivos caracteres psíquicos sexuales.

La Antropometría clínica tiende a poner de manifiesto que el desenvolvimiento endócrino determina diferentes tipos somáticos, a los que se refieren disposiciones morbosas particulares.

Según Kretschmer, los factores humorales intervienen de una manera íntima en las manifestaciones esenciales de la psiquis; la correlación entre la estructura del cuerpo y el temperamento se establecen por la vía humoral y endócrina. Ciertos fenómenos de uno y de otro

desaparecen por la extirpación precoz de ciertas glándulas endócrinas. El niño con hipotiroidismo presenta temperamento obtuso y detención en el desarrollo físico, bajo la forma de cretinismo y de nanismo. La castración precoz hace el temperamento flemático e hipobúlico y el cuerpo toma aspecto eunucoide con alargamiento exagerado de las extremidades y desaparición del sistema piloso.

En la breve exposición que antecede he intentado poner de manifiesto las relaciones que guardan las glándulas de secreción interna en el determinismo de la constitución física y mental, como preparación al punto de tesis elegido. Las consideraciones han sido más que breves, pero sería imposible exponer todas las teorías que existen y las clasificaciones de temperamentos y constituciones. Voy sin embargo a señalar por último algunos de los temperamentos que están íntimamente ligados con el funcionamiento glandular, tomados de la obra de "Ruiz y Funes," de acuerdo con la clasificación de Pende, por ser útiles al desarrollo ulterior de este trabajo.

Temperamento hiperpituitario.—Los individuos con este temperamento se caracterizan por ser delgados, tener miembros largos, cara ancha, desarrollo de los pies y de las manos, rasgos faciales toscos, dientes grandes y separados; los orificios de las glándulas sebáceas de la piel son bastante ostensibles; tienen abundancia de vello en el tronco y frecuentemente también en los miembros; cabello abundante; musculatura desarrollada; unos son hipertensos y otros arterioesclerosos hipertónicos, con hiperperistaltismo, y psíquicamente inquietos, con eretismo mental; hiperemotivos, no obstante que en general su inteligencia está bien desarrollada.

Temperamento hipopituitario.—Se caracterizan porque el crecimiento es insuficiente, los huesos se desarrollan como normalmente; quienes lo presentan son individuos adiposos, con cabeza pequeña, con retardo en la época de la dentición, tienen cabalgamiento de los dientes sobre la mandíbula inferior; la nariz es estrecha y puntiaguda, la boca demasiado pequeña, los labios delgados, las órbitas en algunas ocasiones están demasiado próximas y en otras separadas. La respiración es dificultosa por la frecuencia de vegetaciones adenoides, las manos son pequeñas con adelgazamiento de las falanges; los órganos genitales en el hombre están reducidos de tamaño, ahogados, pudiéramos decir, en gran cantidad de tejido adiposo, y es bastante frecuente la criptorquidia. Son vagotónicos, con presión arterial baja y marcada tendencia a la hipotermia y de pulso lento.

Desde el punto de vista psíquico presentan síndrome oligofrénico; hay retardo en el desarrollo intelectual, su carácter es caprichoso, carentes de sentido moral y manifiestan torpeza psíquica, puerilismo mental, apatía y frecuentes impulsiones. Este cuadro se presenta en los dos sexos.

Temperamento hipogenital.— Este temperamento se denomina generalmente tipo hipogenital esencial (tipo eunucoide), el cual se caracteriza porque los miembros inferiores y principalmente porque las piernas son largas, la cabeza poco desarrollada así como el tronco; la estatura es superior a la media; los órganos genitales poco desarrollados y con insuficiencia de los caracteres sexuales secundarios tanto somáticos como psíquicos.

Temperamento hipergenital. — Caracterizado por el exagerado desarrollo de los caracteres sexuales; el tórax grande, más que el abdomen, con pelvis chica, con acortamiento del tamaño de los diámetros; los miembros son cortos; la cabeza voluminosa, y la estatura superior a la media, en relación con el tamaño de la misma. Son individuos fuertes, bien musculados, de carácter reposado, afables, en algunas ocasiones, alegres, enérgicos, con tendencias artísticas. En la mujer la talla es menor que la normal; sus caracteres sexuales se desarrollan precozmente, con exageración de la sensibilidad erógena en los órganos genitales y en los senos.

Temperamento hipersuprarrenal.—Estos individuos se caracterizan por gran desarrollo muscular; su tensión arterial está elevada; tienen aumento del tamaño del corazón izquierdo; su carácter es agresivo. En la mujer se pone de manifiesto la obesidad, abundancia de cabello, desarrollo genital precoz y masculinismo del carácter.

Temperamento hiposuprarrenal.—Los sujetos que lo tienen presentan miembros largos, con tronco corto, poco desarrollo del tórax. Son flacos, con aspecto caquéctico; la musculatura, tanto la estriada como la lisa es poco desarrollada; hay debilidad en el desarrollo cardíaco y vascular, pues sufren síncope con facilidad; su tensión arterial es baja; tienen linfocitosis sanguínea y frecuentemente eosinofilia y aumento de la pigmentación en las partes descubiertas del cuerpo. Presentan tendencia a la melanodermia, a la melancolía y al pesimismo.

Frecuentemente se asocia este cuadro con el del hipertiroidismo.

Temperamento hipertímico. — Según Pende, los individuos con temperamento hipertímico son proporcionados y bellos en sus formas, delicados, de piel transparente, con cabellos largos y sedosos y movimientos suaves. Propenden a adquirir la tuberculosis y otras infecciones, y además son emotivos con tendencia a la eretofobia.

Capítulo Tercero

Tipos Biológicos

Teorías Endógena y Exógena

sin interés y sin precisión; choca por su monotonía estereotipada; pero en algunas ocasiones estos enfermos, que son unos antisociales, escapan a la observación por su buen juicio y lógica de ser. Los temperamentos cicloide y esquizoide se dan en personalidades fluctuantes entre las zonas de la salud y de la enfermedad; son la imagen correcta que las psicosis caricaturizan, según la expresión de Sacristán.

Existen igualmente dentro de la clasificación de Kretschmer, el tipo atlético (normal), el tipo leptosómico (estrecho), el displásico (afectos de síndromes pluriglandulares, eunucoides, obesos, infantiles, e hipoplásticos) y los degenerativos, integrados por histéricos, epileptoides, paranoides, etc.

En los materiales investigados por Kretschmer; los tipos asténico, atlético y displásico se presentan en los esquizofrénicos, y el pícnico y sus formas mixtas en los circulares. Kretschmer se cuida de advertirnos que la herencia humana intercaló formas mixtas entre los temperamentos puramente ciclotímicos y esquizotímicos.

La importancia práctica de sus clasificaciones las expresa Kretschmer, diciendo: si el diagnóstico del espíritu, mediante la estructura corporal, continúa prosperando en este sentido, proporcionará nuevos caminos, no sólo al sabio y al artista, sino también al conocedor práctico de los hombres, al pedagogo, al juez.

Kretschmer, para el estudio de los individuos dentro de su clasificación, propone la siguiente forma, que es la que se ha seguido en este estudio.

Tipo asténico.—(Leptosoma.)—La denominación de leptosoma es más propia, porque no incluye el concepto de debilidad e inferioridad orgánica que despierta el de asténico, que puede reservarse para una variedad del tipo leptosoma.

Características principales: el cráneo del asténico puede tener la forma natiforme, en pilón, en quilla o presentar dolicocefalia, con circunferencia pequeña del cráneo, con cabeza pequeña y baja, nariz larga y afilada.

Desproporción del desarrollo vertical sobre el transversal. La falta de desarrollo transversal se refiere a la pared comprendiendo piel, tejido celular, músculos, huesos y sistema vascular (huesos largos y delgados, preponderancia del tejido tendinoso sobre el muscular, vasos delgados poco visibles).

El tipo leptosoma extremo correspondiendo a la variedad asténica, quedaría representado así: Sujeto delgado, angosto, pareciendo más alto de lo que es, de piel fina y pálida, estrecho de hombros, brazos delgados y largos, manos huesosas, tórax largo y angosto, en el que se pueden fácilmente contar las costillas, ángulo costal agudo y saliente, décima costilla volante, vientre plano, pobre en tejido celular subcutáneo y extremidades inferiores como las superiores. Peso en desproporción

con la estatura así como desproporción entre los perímetros torácico y pélvico.

Hay una variedad del tipo leptosoma cuyas características son: hombros anchos, pero tórax plano y muy estrecho. En lugar de abdomen pobre en grasa puede haber vientre colgante, caído por enteroptosis, con acúmulo de grasa, de tipo eunucoide o femenino. Frecuentemente se presentan estigmas displásicos; infantilismo, feminismo, eunucoidismo (estatura elevada y extremidades muy largas).

También se presentan combinaciones del tipo atlético con el asténico, correspondiendo el tipo general ya al primero, ya al segundo. Estos tipos pueden perfectamente llamarse leptomios, pero no dentro del concepto limitado del asténico.

El tipo leptosoma persiste por toda la vida del sujeto y es raro ver que con la edad se presente aumento en el desarrollo del tejido adiposo o muscular.

Es común observar, como estigma biológico, envejecimiento prematuro, que es fácil apreciar por el estado de la piel, sistema vascular, disminución de los tejidos adiposos y muscular que indican trastornos del metabolismo. Entre las mujeres es frecuente encontrar el tipo asténico hipoplástico (talla pequeña, desarrollo total por debajo de lo normal). La relación entre peso y estatura es menor en el hombre que en la mujer.

Tipo atlético.—Características principales: desarrollo notable del esqueleto, la musculatura y la piel. El tipo extremo correspondería al siguiente cuadro: sujeto de estatura media o elevada, hombros anchos y caídos; tórax amplio, vientre tenso, que se adelgaza hacia abajo, por lo que aparecen la pelvis y las extremidades inferiores gráciles y ligeras en relación con el tórax y con los hombros. La cabeza recia y alta se yergue sobre un cuello recto y largo, en la que la saliente del trapecio da un aspecto característico a la espalda. La nariz es huesosa y chata, la barba saliente, bien desarrollada; el perfil de la cara es poco saliente; la forma de la cara es la de escudo angosto; sin embargo puede ser ovoide alargada o de forma heptagonal.

El desarrollo muscular se aprecia bajo forma de relieves en distintas partes del cuerpo, el desarrollo óseo se dibuja sobre todo en la cara y en las articulaciones de la garganta del pie y del puño. Las extremidades muy grandes hacen pensar en la acromegalia, la circunferencia de la mano está por encima de la media, así como el ancho de los hombros. La piel gruesa, es tosca y a veces pastosa; el tejido célula-adiposo, por el contrario, presenta desarrollo normal, lo que permite apreciar los relieves musculares.

Además de éste tipo se presentan variedades: mezcla con el tipo eunucoide caracterizado por extremidades muy largas, manos grandes y huesosas; casos de feminismo con pelvis femenina. El porcentaje de éste tipo es menor que el de leptosoma.

En las mujeres es más frecuente observar desarrollo exagerado del tejido adiposo en el tipo atlético, pero éste desarrollo es generalizado y no electivo; también se ha visto el tipo atlético en la mujer unido a signos de masculinismo: hombros grandes, con desproporción entre cintura acromial y pélvica. En ésta aparece desagradable, desproporcionado, dando la idea de algo anormal. Ello se debe a que en el hombre el tipo atlético corresponde al ideal de belleza mientras que en la mujer no sucede así.

Tipo pícnico.—Características principales: estos sujetos presentan la expresión de salud, blandura y delicadeza, y en algunos ciclotímicos bondad; las mejillas y la nariz tienen color rojizo; la nariz es mediana, con perfil recto o aguileño, la nariz puede también ser ancha pero no aplastada, con su punta roma; los ojos hundidos y pequeños; rara vez se observa exoftalmos; la frente ancha y convexa. La forma del cráneo, por regla general, es la de pentágono plano.

El pelo tiene tendencia a invadir la cara; hay tendencia a la calvicie en forma de superficie lisa, uniforme, perfectamente delimitada hacia atrás; las cejas son medianamente abundantes, la barba exuberante, con abundancia de vello en los órganos genitales y en las axilas.

Presentan igualmente circunferencia exagerada de las cavidades (cabeza, tórax, abdomen) y tendencia a la acumulación de grasa en el tronco, contrastando con las extremidades gráciles y ligeras. El tipo extremo correspondería a una figura de estatura media o pequeña, cara ancha sostenida por un cuello corto y hundido en los hombros; vientre rico en tejido célula-adiposo, de tórax abombado. Extremidades redondeadas con pocos relieves óseos o musculares, manos pequeñas y grasosas, un poco gruesas. Las articulaciones así como las clavículas son delgadas. Hombros redondeados, altos, proyectados adelante, con un pliegue formado por el borde anterior del deltoides. Saliente xifótica de la columna cervical, debida a la proyección de la cabeza hacia adelante, sobre el tórax. Distancia entre barba y esternón muy corta, más que los tipos anteriores y correspondiendo al mismo plano vertical. La desproporción entre ancho de hombros (aquí pequeña) y circunferencia de tórax es mucho mayor que en el atlético, en el que la circunferencia es pequeña y el ancho es máximo (Atleta— $\frac{30}{91}$; Pícnico— $\frac{36}{94}$).

Las extremidades son cortas, hay acúmulo de grasa en el tronco, en la cara, muslos, pantorrillas, antebrazos y manos. El tronco y las piernas muy delgadas; los músculos de mediano desarrollo; estatura media, peso en relación con la estatura; oscilaciones frecuentes del peso y muy marcadas de acuerdo con los estados afectivos. Estas características se pueden apreciar después de los treinta años de edad, el peso se modifica con la vejez.

Inmediatamente consigno una tabla de medidas tomadas en Alemania, referidas a cada uno de los tipos antes anotados, consideradas

como las más frecuentes. Esta tabla fué tomada del libro "Constitución y Carácter" de Kretschmer.

	TIPO LEPTOSOMA		TIPO ATLETICO		TIPO PICNICO	
	H.	M.	H.	M.	H.	M.
Estatura	168.4	153.0	170.0	163.1	167.8	156.5
Peso	50.5	44.4	62.9	61.7	68.0	58.3
Ancho de hombros	35.5	32.8	39.1	37.4	36.9	34.3
Perímetro torácico	84.1	77.7	91.7	86.0	94.5	86.0
Perímetro abdominal	74.1	67.7	79.6	75.1	88.8	78.7
Perímetro pélvico	84.7	82.2	91.5	95.8	92.0	94.2
Circunf. del antebrazo	23.5	20.4	26.2	24.2	25.5	22.4
id. de la mano	19.7	18.0	21.7	20.0	20.7	18.6
id. de la pierna	30.0	27.7	33.1	31.7	33.2	31.3
Longitud de la pierna	89.4	79.2	90.9	85.0	87.4	80.5

Tipos displásicos. Sumamente frecuentes son los tipos displásicos entre los esquizofrénicos y muy raros entre los circulares.

A.—Grupo de los eunucoides.—I.—Gigantismo eunucoide: tienen las extremidades muy largas en proporción al tronco, talle delgado, femenino, caderas anchas, circunferencia pélvica exagerada y desarrollo incompleto del sistema piloso genital. Hipoplasia genital.

II.—Gigantismo con cráneo en pilón.—Tienen cara alargada y huesosa, nariz chata y cráneo característico. Bigote como cepillo, cejas desarrolladas y ásperas, estatura por encima de lo normal, actitud inclinada hacia adelante, manos excesivamente grandes. También se observan estigmas eunucoides, extremidades excesivamente largas, pélvis femenina, hipoplasia de los órganos genitales con homosexualidad.

III.—Extremidades muy largas como en los eunucoides, hipoplasia genital. Esqueleto masculino; hombros anchos, pélvis estrecha, desarrollo exagerado de músculos y tendones. Tipos atlético o asténico. Poco desarrollo de las glándulas mamarias; tórax estrecho, trastornos en la menstruación. Desarrollo piloso exagerado, de tipo masculino (bigote, barba, piernas, brazos, órganos genitales).—Utero y ovario infantiles, hay falta de menstruación. Piel mixedematosa, áspera y poco elástica. Trastornos vasomotores y tiroideos. (No siempre se encuentran estos caracteres reunidos en totalidad, pueden faltar algunos, y es frecuente ver asociados el tipo atlético femenino, con algunos de los que acabamos de describir.)

B.—Grupo de los eunucoides con displasia poliglandular.

El acúmulo grasoso de tipo pícnico es raro en los esquizofrénicos, en cambio es frecuente observar distrofias adiposas con localizaciones caprichosas coincidiendo con trastornos endócrinos francos. Entre éstos podemos citar en el hombre una localización en las regiones glúteas coincidiendo con homosexualismo; otras en el abdomen, por debajo de la cicatriz umbilical. El tipo adiposo genital entra en éste grupo.

C.—Grupo de desarrollo infantil e hipoplástico.

No sólo se trata de hipoplasia (disminución proporcional de todas las medidas del cuerpo), sino también de displasia. Es frecuente encontrar éste tipo entre los esquizofrénicos y raro en los circulares. La hipoplasia (disminución de las medidas) se encuentra de preferencia en la cara, en las extremidades y en la pélvis. Tipo facial hipoplástico (esquizofrénicos, asténicos, epilépticos y criminales degenerados). La cara de tipo infantil se encuentra fuera de los casos francos de infantilismo, también con frecuencia entre los esquizofrénicos, epilépticos y criminales degenerados. Se caracteriza por lo poco saliente de los rasgos, por lo borroso del perfil, casi rectilíneo (nariz pequeña, corta, aplastada, frente poco saliente, labios finos y delgados, barba pequeña). Labio superior levantado, como si la piel no fuera suficiente y apenas alcanzara a cubrir los dientes. La piel es pálida y pastosa. La altura de la cara vista de frente está por debajo de la normal.

Acromicria.—Hipoplasia de las extremidades, manos y pies. Este signo es muy frecuente en los esquizofrénicos. La hipoplasia comienza desde el antebrazo para el miembro superior y desde la pierna para el miembro inferior y se refiere a todas las dimensiones. La acromicria puede coincidir con desarrollo normal o exagerado de algunas partes del cuerpo (cintura escápulo-humeral), lo que hace más notable la hipoplasia. En algunos casos la acromicria puede ser considerada como una variante del infantilismo genital, (pélvis infantil, desarrollo piloso escaso, distribución infantil del pániculo célula-adiposo, hipoplasia genital).

Hipoplasia del tronco.—Se refiere sobre todo a anomalías en el desarrollo pélvico: pélvis estrecha, recta, poco contorneada, coincidiendo en la mujer con trastornos en la menstruación o hipoplasia de los órganos sexuales.

El cuadro que consigno inmediatamente es el que recomienda Kretschmer, para el estudio de los sujetos sometidos a estudio y el que se siguió en ésta tesis.

ESQUEMA DE LA CONSTITUCION

I.- CRANEO Y CARA

Cara.—Grande, mediana, pequeña, larga, corta, angosta, ancha, huesosa, no huesosa, caída, recogida, angulosa; con piel delgada, gruesa, fina, brillante, reseca, de color pálido, rosada, amarillenta, morena, congestionada, roja, o rojo obscuro, azulada, pastosa, grasosa, lisa, arrugada, marchita, escamosa, con los capilares dilatados.

OJOS.—Grandes, medianos, chicos, salientes, hundidos, brillantes, marchitos, azules, verdes, café, grises, negros.

BORDE ORBITARIO SUPERIOR.—Elevado, bajo, saliente, romo.

NARIZ.—Grande, mediana, pequeña, larga, corta.

Porción cartilaginosa: delgada mediana, gruesa.

Porción ósea: angosta, mediana ancha, aplastada.

Punta: respingada mediana, aplastada.

da, plana, de color pálido o roja; perfil convexo, recto o cóncavo, saliente, hundido, sinuoso.

Raíz: prominente o hundida.

BOCA.—Grande, mediana, pequeña, bien dibujada, apenas dibujada.

LABIOS.—Delgados, medianos, gruesos, salientes, planos, abiertos, cerrados, pálidos o rojos.

Labio superior: grande, chico, mediano, con algo de prognatismo.

MANDIBULA INFERIOR.—Grande, mediana, pequeña, saliente (prognatismo) deformada, angulosa.

BARBA.—Afilada, redondeada, mediana.

LARINGE.—Prominente, mediana, o poco prominente.

DIENTES.—Grandes, medianos, pequeños, regulares, irregulares, sanos, enfermos.

ENCÍAS.—Hinchadas, medianas, aplastadas.

OREJAS.—Grandes, medianas, pequeñas, despegadas, pegadas, planas, enrolladas, delgadas, gruesas, adherentes, libres.

II.- CUERPO - CONSTITUCION

Grande, mediano, pequeño, ancho de hombros, delgado, grueso, de extremidades cortas, largas; infantil, masculino, femenino, senil.

POSICION DEL CUERPO.—Flácida, estirada, encorvada, derecha.

ESQUELETO.—Débil, mediano, fuerte.

ARTICULACIONES.—Angostas, medianas, anchas.

MUSCULATURA.—Delgada, mediana, gruesa, flácida, fuerte.

Relieves musculares: marcados, poco marcados.

Capa grasosa: delgada, mediana, gruesa.

Desarrollo infantil masculino, femenino.

Desarrollo parcial de determinados lugares.

CABEZA.—Grande, mediana, pequeña, erguida, hundida entre los hombros.

CUELLO.—Largo, mediano, corto, delgado, grueso.

BRAZOS.—Largos, medianos, cortos, delgados, gruesos.

FRENTE.—Punteaguda, mediana, alta, baja, redondeada, plana, ancha, angosta, angulosa; arco superciliar muy desarrollado, débilmente desarrollado; glabella amplia, angosta.

PERFIL.—Recto, convexo, anguloso, bien desarrollado, no desarrollado.

CONTORNO FRONTAL DE LA CARA:

I.—Escudo amplio.

II.—Escudo angosto.

III.—Forma ovoide alargada.

IV.—Forma ovoide corta.

V.—Ovulo infantil.

VI.—Forma heptagonal.

VII.—Forma no caracterizada.

DESARROLLO DE LA CARA.—Tipo masculino, femenino, demasiado joven, demasiado viejo en relación con la edad.

ESQUELETO DEL CRANEO.—Grande, mediano, pequeño, largo, corto, ancho, angosto, alto, bajo, con forma de cráneo natiforme, en quilla, en pilón en cuadrado etc.

Protuberancia occipital; saliente, mediana, plana, fuerte, débilmente desarrollada.

PIERNAS.—Largas, medianas, cortas, delgadas, gruesas, en O o en X.

MANOS.—Grandes, medianas, pequeñas, largas, cortas, angostas, anchas, finas, toscas, flácidas, fuertes, suaves, huesosas. Extremidades de los dedos alargadas, medianas o gruesas.

PIES.—Grandes, medianos, pequeños, largos, cortos, anchos, angostos. Pie plano, empeine.

HOMBROS.—Angostos, medianos, anchos, caídos, erguidos.

TORAX.—Plano, mediano, convexo, sumido, largo, corto, angosto, ancho; tipo tísico, enfisematoso, en quilla, en zapatero.

ABDOMEN.—Grueso, mediano, delgado, tenso, flácido, forma especial.

COLUMNA VERTEBRAL.—Recta, mediana, ondulada, lordosis, escoliosis, cifosis.

PELVIS.—Desarrollo óseo: mucho, mediano o poco; escaso desarrollo grueso; pélvis mediana, angosta, bien formada, masculina, femenina, infantil, plana.

III.- SUPERFICIE DEL CUERPO

PIEL.—Delgada, mediana, gruesa, suave, áspera, tensa, flácida, elástica, transparente, opaca.

PIGMENTO.—Abundante, débilmente abundante, medianamente abundante. Secreción sebácea: intensa, medianamente intensa, o débilmente intensa. Si hay acné, eczema, forunculosis, pigmentación de las mucosas.

VASOS.—Capilares cutáneos: visibles, medianamente visibles, invisibles, en la cara, manos, pies, cuerpo.

Dermografismo intenso, mediano, débil en la cara.

Cara azulada roja, roja obscura, pálida; manos azuladas, rojas, pálidas, obscuras; pies: rojos, pálidos, azulados, rojo oscuros.

Color de la piel: morena, blanca, amarilla, roja, pálida, etc.

Pies y manos húmedos, secos o medianamente húmedos.

Fríos.

Cuerpo caliente, o frío.

Secreción sudoral en las axilas, abundante, mediana, escasa o nula.

ARTERIAS.—Gruesas, medianas, delgadas, endurecidas, suaves, onduladas, salientes.

PULSO.—Número de pulsaciones por minuto, tensión, hipotenso, amplio, poco amplio, rítmico, arrítmico, extrasistólico.

VENAS.—Salientes, visibles, poco visibles, várices.

IV.- GLANDULAS Y ORGANOS

ORGANOS GENITALES.—Grandes, medianos, pequeños.

TIROIDES.—Grande, pequeño, mediano; existencia de bocio con sus caracteres.

GANGLIOS LINFATICOS.—Numero-

DESARROLLO DEL PELO.—Rubio, castaño, negro, gris, blanco, abundante, escaso, medianamente abundante.

Cejas: abundantes, medianas, escasas.

Barba: Abundante, mediana, escasa.

Pecho: Abundante, mediano, escaso.

Brazos: Abundante, mediano, escaso.

Piernas: Abundante, escaso, mediano.

En los órganos genitales: abundante, mediano, escaso.

En las axilas: abundante, escaso mediano.

En el cuero cabelludo, si el pelo es largo, mediano, corto. Límite detrás de la frente, de las sienas, de la nuca. Límite frontal horizontal, delgado, mediano, grueso, suave, áspero, lacio, ondulado, rizado.

Calvicie en la frente, en la coronilla, en la nuca, limitada, no limitada, lucente, opaca, incompleta.

CEJAS.—Cerradas: distancia entre las dos; encrespadas, medianas, lisas, anchas, angostas.

BIGOTE.—Suave, áspero, encrespado, lacio, ondulado, rizado, angosto, mediano, ancho, desarrollo exagerado, hacia la cara, hacia el cuello; desarrollo regular, irregular.

Desarrollo piloso de los órganos genitales, tipo femenino, o masculino. Resto del cuerpo: vello largo, corto, desarrollo horizontal o vertical. Desarrollo piloso atípico, anormal.

so, diseminados, grandes, pequeños, duros, blandos.

GLANDULA MAMARIA.—Grande, pequeña, tipo masculino, femenino, erguidas, flácidas. Pezón muy desarrollado o poco desarrollado.

Padecimientos de orden médico.

V.- MEDIDAS

Estatura.

Peso.

Ancho de hombros.

Perímetro torácico.

Perímetro pélvico.

Perímetro abdominal.

Circunferencia del antebrazo.

Circunferencia de la pierna.

Circunferencia de la mano.

Longitud de la pierna.

Longitud del brazo.
Cráneo: diámetro antero-posterior,
transversal, vertical. (Altura).
Cara: Longitud de la nariz, ancho

de la cara, ancho de la nariz, anchura
de la boca, altura de la cara. Tamaño
de la oreja.

VI.- FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental.
Comienzo de la pubertad.
Comienzo de la menopausa.
Comienzo de la adiposidad.
Comienzo del adelgazamiento.
Comienzo de la calvicie.
Comienzo de determinadas enfermedades.

Anomalías sexuales.

VII.—SINTESIS DE LA CONSTITUCION.

VIII.—TIPO DE LA PERSONALIDAD.

IX.—HERENCIA.

Capítulo Cuarto

Presentación de los Casos Clínicos

CASO NUM. 1.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de primera.)

Nombre: M. G.
Edad: Dieciocho años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Ferrocarrilero.
Estado Civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA CATA-TONICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (28-XI-1925.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 69 centímetros.
Busto sentado: 89,5 centímetros.
Braza: 1 metro, 66 centímetros.
Peso (Desnudo): 66 kilos.
Anchura de hombros: 38,5 centímetros.
Perímetro torácico: 93 centímetros.
Perímetro abdominal: 87 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.70 centímetros.
Anchura máxima: 15.10 centímetros.
Índice cefálico: 80.70 centímetros.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.20 centímetros.

Índice medio cefálico de altura: 78.10 centímetros.
Módulo cefálico: 15.66 centímetros.

CARA.

Longitud mento-nasio: 12.70 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.60 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.10 centímetros.
Anchura bi-cigomática máxima: 14.00
Índice facial: 90.71.
Índice fisonómico: 75.26.
Diámetro frontal mínimo: 10.40 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice nasal: 53.03.

BOCA

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice auricular: 58.33.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 19 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 18 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de

Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Muy escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Chica, algo chata, blanda.
Porción ósea de la nariz: Ligeramente excavada.
Punta de la nariz: Ligeramente chata.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: Poco prominente.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide, corta.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Caídos, medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.

Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 88 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (28-XI-1925.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana, ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué obtenido por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 2.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: R. D. E.
Edad: Treinta y siete años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Empleado.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (21-VIII-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 66 centímetros.
Busto sentado: 89 centímetros.
Braza: 1 metro, 64.5 centímetros.
Peso (Desnudo): 60 kilos, 800 gramos.
Anchura de hombros: 35.5 centímetros.
Perímetro torácico: 92 centímetros.
Perímetro abdominal: 86 centímetros.
Perímetro pélvico: 92 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 88.6 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.20 centímetros.
Anchura máxima: 14.70 centímetros.
Índice cefálico: 80.70.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.35 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 81.20.
Módulo cefálico: 15.41.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.65 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.00 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.35 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.40 centímetros.
Índice facial: 86.94.

Índice fisonómico: 78.82.
Diámetro frontal mínimo: 9.40 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.15 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice nasal: 61.78.

BOCA

Anchura: 4.90 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.30 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 60.31.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 30 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 26 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 9 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 13 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Profusa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 8 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Mediana.
Borde orbitario: Ligeramente saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Ancha.
Punta de la nariz: Ligeramente ancha.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Falta un incisivo superior, el resto en buenas condiciones.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.

Fronte: Chica y plana.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas, callosas.
Pies: Chicos, con depósito de tejido adiposo.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.
Abdomen: Tenso, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Poco morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.

CASO NUM. 3.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas. De primera.)

Nombre: A. G.
Edad: Treinta años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Tlalpam, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HE-BEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (24-VI-1930.)

Pulso: Frecuencia: 76 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (21-VIII-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICO.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 69 centímetros.
Busto sentado: 88 centímetros.
Braza: 1 metro, 69 centímetros.
Peso (desnudo): 63 kilos.
Anchura de hombros: 38.5 centímetros.
Perímetro torácico: 91.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 79 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 34.5 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 90 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 19.80 centímetros.
Anchura máxima: 15.85 centímetros.
Índice cefálico: 80.05.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.65
Índice medio cefálico de altura: 76.70.
Módulo cefálico: 16.73.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.40 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 14.40 centímetros.
Índice facial: 86.11.
Índice fisonómico: 80.29.
Diámetro frontal mínimo: 10.10 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.80 centímetros.
Anchura máxima: 4.10 centímetros.
Índice nasal: 70.68.

BOCA

Anchura: 5.65 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.90 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice auricular: 62.71.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 24 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 22 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 39 de Broca.
Pelo: (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Mar-

tín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ligera y aplastada. Desviada a la izquierda.

Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, 16-bulo adherente.
Fronte: Grande, con gibas frontales algo marcadas.
Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Forma heptagonal.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: La anotada en la nariz.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Fuerte, bien desarrollada.

Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos, musculados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas, gruesas, musculadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas (callosas).
Pies: Chicos, planos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.

Abdomen: Tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: En regular cantidad.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 85 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Oranos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible. Mediano.

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (24-XI-1930).

CASO NUM. 4.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos, no pensionistas de segunda.)

Nombre: F. V. T.

Sexo: Masculino.

Edad: Veintiocho años, aproximadamente.

Ocupación: Panadero.

Estado civil: Casado.

Lugar de nacimiento: Toluca, México.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (5-III-1923.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro 66.5 centímetros.

Busto sentado: 87 centímetros.

Braza: 1 metro 63 centímetros.

Peso (Desnudo): 66 kilos 900 gramos.

Anchura de hombros: 36 centímetros.

Perímetro torácico: 94 centímetros.

Perímetro abdominal: 86 centímetros.

Perímetro pélvico: 92 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 33 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 89 centímetros.

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto.)

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.

Índice cefálico: 18.60.

Longitud máxima: 19.00 centímetros.

Anchura máxima: 14.95 centímetros.

Altura (Método de Hrdlicka): 13.70.

Índice medio cefálico de altura: 80.70.

Módulo cefálico: 15.90.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.20 centímetros.

Longitud mento-crinio: 17.60 centímetros.

Altura nasio-crinio: 5.40 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 13.80 centímetros.

Índice facial: 81.15.

Índice fisonómico: 78.40.

Diámetro frontal mínimo: 9.80 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.10 centímetros.

Anchura máxima: 4.00 centímetros.

Índice nasal: 65.57.

BOCA

Anchura: 6.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.

Anchura máxima: 9.13 centímetros.

Índice auricular: 51.31.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 22 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 21 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.

Borde orbitario: Poco saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ligeramente respingada. Blanda.

Porción ósea de la nariz: Excavada.

Punta de la nariz: Roma.

Boca: Grande. Bien dibujada.

Labios: Gruesos.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Chico y redondeado.

Laringe: No prominente. Mediana.

Dientes: Dos premolares inferiores cariados.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Medianas, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Plana, chica.

Perfil: Excavado al nivel de la raíz de la nariz.

Contorno frontal de la cara: Forma heptagonal.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino.

Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Mediana.

Cabeza: Chica.

Cuello: Corto y grueso.

Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.

Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas y huesosas.

Pies: Chicos y huesosos.

Hombros: Ligeramente caídos. Medianos.

Tórax: Amplio, convexo, con depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.

Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Recta.

Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Abundante.

Vasos:

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, amplitud media, tensión media, rítmico.

Venas: Poco visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (5-III-1923.)

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 5.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: B. R. N.
Sexo: Masculino.
Edad: Veintiséis años.
Ocupación: Estudiante de Jurisprudencia.
Estado Civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Tepic, Nayarit.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (18-nov.-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 75 centímetros.
Busto sentado: 91 centímetros.
Brazo: 1 metro, 74 centímetros.
Peso (Desnudo): 69 kilos.
Anchura de hombros: 38,5 centímetros.
Perímetro torácico: 93,5 centímetros.
Perímetro abdominal: 85 centímetros.
Perímetro pélvico: 91,5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25,5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 21,5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32,5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 90,5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Índice cefálico: 80,80.
Longitud máxima: 18,80 centímetros.
Anchura máxima: 15,20 centímetros.
Altura (Método de Hrdlicka): 14,10 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 83,00.
Módulo cefálico: 15,88.

CARA

Longitud mento-nasio: 14,20 centímetros.
Longitud mento-crinio: 19,40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5,20 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 14,15 centímetros.
Índice facial: 100,70 (?).
Índice fisonómico: 72,68.
Diámetro frontal mínimo: 10,20 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 7,20 centímetros.
Anchura máxima: 4,00 centímetros.
Índice nasal: 55,55.

BOCA

Anchura: 5,60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6,20 centímetros.
Anchura máxima: 4,00 centímetros.
Índice auricular: 64,35.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 34 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 24 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel: (Tabla de Broca): 39 de Broca.
Pelo: (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba: (Color, Tabla de Fisher): 4 Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos: (Color del iris, Tabla de Martín): 3 Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana. Blanda.
Torción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande. Bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Algo redondeado.
Laringe: No prominente. Mediana.
Dientes: Faltan dos grandes molares superiores y dos inferiores.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Plana, grande.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 75 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.

CASO NUM. 6. FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas. De segunda.)

Nombre: A. R. V.
Edad: Veinticuatro años, aprox.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Carpintero.
Estado Civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (4-XII-1929.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 68 centímetros.
Busto sentado: 86 centímetros.

Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (18-nov.-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.
CONSTITUCION FISICA: Mediana. ATLETA.
TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.
HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue recogido por interrogatorio indirecto.)

Brazo: 1 metro, 69,5 centímetros.
Peso (desnudo): 63 kilos.
Anchura de hombros: 36,5 centímetros.
Perímetro torácico: 90 centímetros.
Perímetro abdominal: 78 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 26 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 35 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 91,5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 18,80 centímetros.

Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 75.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.60 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.50.
Módulo cefálico: 15.53.

CARA

Longitud mento-nasio: 13.60 centímetros.
Longitud mento-crinio: 19.10 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.50 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.70 centímetros.
Índice facial: 99.27.
Índice fisonómico: 71.72.
Diámetro frontal mínimo: 10.70 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.30 centímetros.
Índice nasal: 50.00.

BOCA

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.90 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 64.40.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 14 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 9 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo: (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Abundante, tupido.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente. Mediano.

Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana. Blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Regular. Bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente. Mediana.
Dientes: Integros. Sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas. Lóbulo adherente.
Frente: Algo grande, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara. Ovoides alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Fuerte. Bien desarrollada, relieves musculares marcados.
Cabeza: Grande.
Cuello: Algo largo y delgado.
Brazos: Algo largos y medianamente gruesos, sin depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y gruesas, sin depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas. (Toscas.)
Pies: Grandes y huesosos, planos.
Hombros: Caídos, medianos, musculados.
Tórax: Amplio, convexo, musculado, con poco depósito de tejido adiposo.
TIPO ATLETA.

Abdomen: Tenso, sin depósito de grasa.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante, negro.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible. Mediano.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (24-XII-1929.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

CASO NUM. 7.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de primera.)

Nombre: L. H.

Edad: Dieciocho años, aproximadamente.

Sexo: Masculino.

Ocupación: Soldado.

Estado Civil: Soltero.

Lugar de nacimiento: México, D. F.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HE-BEFRENICA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (28-XII-1928.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 58 centímetros.
Busto sentado: 79.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 57 centímetros.
Peso (desnudo): 47 kilos, 500 gramos.
Anchura de hombros: 30.5 centímetros.
Perímetro torácico: 80 centímetros.
Perímetro abdominal: 71 centímetros.
Perímetro pélvico: 80 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 30.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89.5 centímetros.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMCO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue tomado por interrogatorio indirecto.)

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 19.00 centímetros.
Anchura máxima: 14.45 centímetros.
Índice cefálico: 76.05.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.20 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 78.90.
Módulo cefálico: 15.53.

CARA

Longitud mento-nasio: 14.65 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 3.75 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.40 centímetros.
Índice facial: 109.32 (?)
Índice fisonómico: 72.82.
Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.30 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice nasal: 69.81.

BOCA

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.65 centímetros.
Índice auricular: 60.83.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 12 kilos.
OBSERVACIONES ESPECIALES
Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 43 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Muy escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Blanda, mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Chica, gibas frontales marcadas medianamente.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide infantil.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Chico.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.

Pies: Grandes y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Poco amplio, enjuto, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada adelante. Cifosis dorsal.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 70 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (28-XII-1925.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil, ASTENICO, DISPLACICO, INFANTILISMO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ES QUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 8.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: J. C.
Edad: Treinta años de edad, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Dependiente de comercio.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Chihuahua, Chih.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA CATA-TONICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (13-VII-1927.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 69 centímetros.
Busto sentado: 81.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 64.5 centímetros.
Peso (Desnudo): 63 kilos, 500 gramos.
Anchura de hombros: 38.5 centímetros.
Perímetro torácico: 92 centímetros.
Perímetro abdominal: 85 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 26 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 33.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 90 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 18.40 centímetros.
Anchura máxima: 14.10 centímetros.
Índice cefálico: 76.62.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.00.
Índice medio cefálico de altura: 80.00.
Módulo cefálico: 15.18.

CARA.

Longitud mento-nasio: 12.20 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.20 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.00 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.45 centímetros.
Índice facial: 79.99.

Índice fisonómico: 72.38.
Diámetro frontal mínimo: 9.25 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice nasal: 61.66.

BOCA.

Anchura: 5.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 63.15.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 13 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 11 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Muy escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Chico, afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Plana, Mediana.

Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide, corto.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Chico.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y delgado.
Brazos: Cortos y algo delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas, delgadas y escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Regularmente amplio, musculado, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con escaso tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

CASO NUM. 9.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: A. C.
Edad: Veintiocho años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.

Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (13-VII-1927.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (18-IV-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 62 centímetros.
Busto sentado: 85.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 61 centímetros.
Peso (Desnudo): 56 kilos.
Anchura de hombros: 33 centímetros.
Perímetro torácico: 80 centímetros.
Perímetro abdominal: 75 centímetros.
Perímetro pélvico: 80 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 29 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 80.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 18.10 centímetros.
Anchura máxima: 13.15 centímetros.
Índice cefálico: 72.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 12.40 centímetros.
Índice cefálico de altura: 79.40.
Módulo cefálico: 14.55.

CARA.

Longitud mento-nasio: 13.5 centímetros.
Longitud mento-crinio: 19.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 7.70 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.80 centímetros.
Índice facial: 101.95 (?).
Índice fisonómico: 64.64.
Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.50 centímetros.
Anchura máxima: 4.00 centímetros.
Índice nasal: 61.53.

BOCA.

Anchura: 5.20 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 57.74.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 17 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 18 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 5 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 10 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Afilada, mediana, blanda.
Porción ósea de la nariz: Ligeramente ancha.

Punta de la nariz: Ligeramente ancha.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: El superior grueso, el inferior mediano.

Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Partido.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, con implantación en asa, lóbulo adherente.

Frente: Grande, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide, corto.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.
Pies: Grandes y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Cilindroide, enjuto, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Poco tenso, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada adelante, cifosis dorsal.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Poco morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles. Blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (18-IV-1930.)

CASO NUM. 10.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: F. G. M.
Edad: Dieciocho años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Campesino.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA CATA-TONICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (21-XI-1930.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 69 centímetros.
Busto sentado: 89.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 66 centímetros.
Peso (Desnudo): 69 kilos 500 gramos.
Anchura de hombros: 37.5 centímetros.
Perímetro torácico: 93 centímetros.
Perímetro abdominal: 87 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 26 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.

Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO. DISPLACICO. INFANTILISMO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue tomado por interrogatorio indirecto.)

CIRCUFERENCIA DE LA PIERNA IZQUIERDA:

33 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 86.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfal.
Longitud máxima: 17.70 centímetros.
Anchura máxima: 13.90 centímetros.
Índice cefálico: 78.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 12.10 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 16.60.
Módulo cefálico: 14.56.

CARA.

Longitud mento-nasio: 13.00 centímetros.
Longitud mento-criño: 18.30 centímetros.
Altura nasio-criño: 5.30 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.30 centímetros.
Índice facial: 97.74.
Índice fisonómico: 72.67.
Diámetro frontal mínimo: 9.70 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 4.50 centímetros.
Índice nasal: 72.58.

BOCA.

Anchura: 5.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 57.57.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 18 kilos.
Mano izquierda presión en kilos: 9 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 39 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher) 3 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Profusa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 6 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande y redonda.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha y blanda.
Porción ósea de la nariz: Poco excavada.
Punta de la nariz: Algo chata.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Medianamente gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente. Mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulos adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Cóncavo.
Contorno frontal de la cara: Forma ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y con depósito de tejido adiposo.
Pies: Chicos y con depósito de tejido adiposo.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Poco abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 85 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (26-III-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
ATLETA.

CASO NUM. 11.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: A. E.
Edad: Treinta años de edad, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (2-VI-1913.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 64 centímetros.
Busto sentado: 87 centímetros.
Braza: 1 metro, 63 centímetros.
Peso (Desnudo): 62 kilos.
Anchura de hombros: 35 centímetros.
Perímetro torácico: 93.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 79.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 92 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 21 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 88 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfaló.
Longitud máxima: 18.80 centímetros.
Anchura máxima: 14.90 centímetros.
Índice cefálico: 79.20.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.55 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 80.40.
Módulo cefálico: 15.73.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.00 centímetros.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Longitud mento-crinio: 16.10 centímetros.

Altura nasio-crinio: 4.10 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.80 centímetros.

Índice facial: 86.95.
Índice fisonómico: 85.71.
Diámetro frontal mínimo: 10.60 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 4.15 centímetros.
Índice nasal: 72.80.

BOCA.

Anchura: 5.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.50 centímetros.
Anchura máxima: 3.75 centímetros.
Índice auricular: 57.69.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 22 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 21 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Muy escaso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ligera-mente ancha y delgada.
Porción ósea de la nariz: Excavada.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: Poco saliente. Mediana.
Dientes: Faltan dos incisivos superiores y dos premolares.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Grande y plana.
Perfil: Cóncavo.
Contorno frontal de la cara: Tipo mas culino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.
Pies: Grandes y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Amplio, convexo con depósito de tejido adiposo en regular cantidad. TIPO PICNICO.
Abdomen: Tenso con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

CASO NUM. 12.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: C. B.
Edad: Treinta y cuatro años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Tehuacán, Pue.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles. Blandas.
Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (2-VI-1913.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (31-VII-1922.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 75 centímetros.
Busto sentado: 88.5 centímetros.

Braza: 1 metro, 73 centímetros.
Peso (Desnudo): 68 kilos.
Anchura de hombros: 36.5 centímetros.

Perímetro torácico: 94.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 87 centímetros.
Perímetro pélvico: 92 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 87 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 19.80 centímetros.
Anchura máxima: 14.70 centímetros.
Índice cefálico: 74.40.
Altura (Método de Hrdlicka): 14.70 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 85.20.
Módulo cefálico: 16.40.

CARA.

Longitud mento-nasio: 14.80 centímetros.
Longitud mento-crinio: 20.20 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 14.50 centímetros.
Índice facial: 102.06 (?).
Índice fisonómico: 71.78.
Diámetro frontal mínimo: 10.40 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 7.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice nasal: 54.28.

BOCA.

Anchura: 6.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Alura máxima: 6.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.95 centímetros.
Índice auricular: 58.95.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 36 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 30 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Abundante. Calvo: Ligeramente.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Profusa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 6 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Algo saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Grande y gruesa.
Porción ósea de la nariz: Recta y mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Partido.
Laringe: Poco saliente.
Dientes: Íntegros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Grande, gibas frontales poco marcadas.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide, alargado.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Largos y bien musculados, con poco depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y bien musculadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Grandes y huesosas.
Pies: Grandes y huesosos, planos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO PÍCNICO.
Abdomen: Tenso, con regular cantidad de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Poco morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.

CASO NUM. 13.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: I. B.
Edad: Treinta y cinco años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Tampico, Tamaulipas.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (7-VII.1929.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 68 centímetros.
Busto sentado: 84.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 64 centímetros.
Peso (Desnudo): 48 kilos, 500 gramos.
Anchura de hombros: 35 centímetros.

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (31-VII-1922.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: Hace aproximadamente un año, (no precisa fecha).
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. PÍCNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTÍMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue tomado por interrogatorio indirecto.)

Perímetro torácico: 84 centímetros.
Perímetro abdominal: 73.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 84 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 30.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicefalo.
Longitud máxima: 18.00 centímetros.
Anchura máxima: 14.75 centímetros.
Índice cefálico: 81.90.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.10 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 80.22.
Módulo cefálico: 15.28.

CARA

Longitud mento-nasio: 13.20 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 4.60 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.80 centímetros.
Índice facial: 95.65.
Índice fisonómico: 77.52.
Diámetro frontal mínimo: 10.40 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.45 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice nasal: 55.81.

BOCA

Anchura: 5.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 59.37.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 8 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 8 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Alargada y emaciada.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Blanca, afilada.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.

Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Caries de todos los premolares.
Encías: Planas sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide, alargado.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Médiana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, sin depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, sin depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y delgadas, huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Enjuto, cilíndrico, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada adelante, cifosis dorsal.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (7-VII-1929.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: Hace aproximadamente un año. No precisa fecha.)

CASO NUM. 14.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: F. G. R.
Edad: Cincuenta años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Cargador.
Estado civil: Casado.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (24-II-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 66 centímetros.
Busto sentado: 90 centímetros.
Braza: 1 metro, 67 centímetros.
Peso (Desnudo): 64 kilos, 600 gramos.
Anchura de hombros: 35 centímetros.
Perímetro torácico: 94 centímetros.
Perímetro abdominal: 86.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 92 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 33 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 88 centímetros.

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 18.60 centímetros.

Comienzo de determinadas enfermedades. Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil, ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Anchura máxima: 14.80 centímetros.
Índice cefálico: 79.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.75 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.30.
Módulo cefálico: 15.71.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.75 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.30 centímetros.
Altura nasio-crinio: 4.55 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.40 centímetros.
Índice facial: 87.68.
Índice fisonómico: 82.20.
Diámetro frontal mínimo: 10.30 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice nasal: 60.65.

BOCA

Anchura: 5.60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.90 centímetros.
Índice auricular: 60.93.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 19 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 16 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Ligeramente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Mediana, con arrugas.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Algo ancha.
Porción ósea de la nariz: Ligeramente ancha.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: Ligeramente prominente. Mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Chica, con gibas frontales poco marcadas.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Forma heptagonal.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y algo grueso.
Brazos: Cortos y delgados, sin depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y delgadas, sin depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Ligeramente caídos, medianos.

Tórax: Medianamente amplio, convexo, con depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.

Abdomen: Poco tenso, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Algo morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 72 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental. (24-II-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 15.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: J. F. G.
Edad: Veintiséis años, aproximadamente.

Sexo: Masculino.
Ocupación: Empleado.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (23-VIII-1928.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 64 centímetros.
Busto sentado: 97 centímetros.
Braza: 1 metro, 63 centímetros.
Peso (Desnudo): 52 kilos.
Anchura de hombros: 33 centímetros.
Perímetro torácico: 83 centímetros.
Perímetro abdominal: 73 centímetros.
Perímetro pélvico: 83 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 29 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 88.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 19.90 centímetros.
Anchura máxima: 14.70 centímetros.
Índice cefálico: 73.80.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.25 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 76.60.
Módulo cefálico: 15.95.

CARA

Longitud mento-nasio: 13.30 centímetros.
Longitud mento-crinio: 19.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.10 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 15.60 centímetros.

Índice facial: 85.25.
Índice fisonómico: 80.41.
Diámetro frontal mínimo: 10.30 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.50 centímetros.
Anchura máxima: 4.00 centímetros.
Índice nasal: 61.53.

BOCA

Anchura: 6.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice auricular: 60.65.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 24 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 22 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Ondulado. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 3 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 7 de Martín. Color de la conjuntiva: Congestionada, (roja). Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Saliente, romo.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ligeramente ancha, blanda.
Porción ósea de la nariz: Ligeramente ancha.
Punta de la nariz: Roma.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Falta una gran molar inferior izquierda, el resto íntegro.

Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulos adherentes.
Frente: Plana y mediana.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Músculatura: Mediana.
Cabeza: Mediana.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.
Pies: Chicos, planos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Medianamente amplios, enjuto, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Ligeramente encorvada. Cifosis dorsal.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Poco morena.
Pigmento: Poco abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.

CASO NUM. 16. FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: I. B. A.
Edad: Treinta y dos años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Tabasco, Tab.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: EQUIZOFRENIA HEBRE-FENICA.

Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental (23-VIII-1928.)
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (13-III-1929).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 75 centímetros.
Busto sentado: 88 centímetros.
Peso (Desnudo): 51 kilos.
Anchura de hombros: 33.5 centímetros.
Perímetro torácico: 83 centímetros.
Perímetro abdominal: 74 centímetros.
Perímetro pélvico: 83.5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 22.5 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.95 centímetros.
Anchura máxima: 15.10 centímetros.
Índice cefálico: 83.80.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.10 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 79.30.
Módulo cefálico: 15.38.

CARA.

Longitud mento-nasio: 13.50 centímetros.
Longitud mento-crinio: 19.00 centímetros.
Altura nacio-crinio: 5.50 centímetros.
Anchura bizigomática máxima: 14.00 centímetros.
Índice facial: 96.42.
Diámetro frontal mínimo: 9.90 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 7.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice nasal: 50.00

BOCA.

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice auricular: 61.66.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 8 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 5 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 22 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Distribución: Muy escasa.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 2 de Martín. Color de conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.

Porción ósea de la nariz: Ligeramente ancha.

Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Mediana, bien dibujada.
Labios: Ligeramente gruesos.
Frogmatismo alveolar: No existe.
Mentón: Ligeramente redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Medianas, bien implantadas, lóbulos adherentes.
Frente: Chica, ligeramente plana.
Perfil: Ligeramente excavado al nivel de la raíz de la nariz.
Contorno frontal de la cara: Forma heptagonal.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Músculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.
Pies: Grandes, planos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Torax: Cilindroide, enjuto, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Ligeramente encorvada adelante. Cifosis dorsal.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: Poco visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (13-III-1929.)

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

CASO NUM. 17.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: L. G.

Edad: treinta años, aproximadamente.

Sexo: Masculino.

Ocupación: Jornalero.

Estado civil: Soltero.

Lugar de nacimiento: México, D. F.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (26-IV-1927).

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 67 centímetros.

Busto sentado: 87.5 centímetros.

Braza: 1 metro, 66 centímetros.

Peso. (Desnudo): 52 kilos, 600 gramos.

Anchura de hombros: 35 centímetros.

Perímetro torácico: 84 centímetros.

Perímetro abdominal: 72.5 centímetros.

Perímetro pélvico: 84 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 32 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 88.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicefalo.

Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

Longitud máxima: 19.00 centímetros.
Anchura máxima: 15.70 centímetros.
Índice cefálico: 82.60.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.60 centímetros.
Índice medio cefálico: 78.40.
Módulo cefálico: 16.10.

CARA.

Longitud mento-nasio: 13.20 centímetros.

Longitud mento-erinio: 18.60.

Altura nasio-erinio: 5.40 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 15.00 centímetros.

Índice facial: 88.00

Índice fisonómico: 80.64.

Diámetro frontal mínimo: 9.90 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.50 centímetros.

Anchura máxima: 4.20 centímetros.

Índice nasal: 64.61.

BOCA.

Anchura: 5.80 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.

Anchura máxima: 3.30 centímetros.

Índice auricular: 54.09.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 12 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 8 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Congestionada (roja). Tamaño: Mediano.

Cara: Grande.

Borde orbitario: Poco saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha, blanda.

Porción ósea de la nariz: Ancha y ligeramente aplastada.

Punta de la nariz: Poco aplastada.

Boca: Grande, bien dibujada.

Labios: Gruesos.

Prognatismo arveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente. Mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica, gibas frontales poco marcadas.

Perfil: Casi recto.

Contorno frontal de la cara: Forma heptagonal.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino.

Esqueleto del cráneo: Grande.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Mediana.

Cabeza: grande.

Cuello: Corto y grueso.

Brazos: Cortos y gruesos, casi sin depósito de tejido adiposo.

Piernas: Cortas y gruesas, casi sin depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas, toscas (callosas).

Pies: Chicos y planos.

Hombros: Rectos, medianos.

Torax: Medianamente amplio, con poco acúmulo de tejido adiposo. TIPO TÍPICO.

Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Ligeramente encorvada adelante. Cifosis dorsal.

Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Abundante.

Vasos.

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: Poco visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (26-IV-1927).

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

CASO NUM. 18.- FICHA DE IDENTIFICACION

Nombre: L. A.
Edad: Veinticinco años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Estado civil: Soltero.
Ocupación: Jornalero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBE-FRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (31-V-1930).

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 69 centímetros.
Busto sentado: 84.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 69 centímetros.
Peso. (Desnudo): 65 kilos.
Anchura de hombros: 38.5 centímetros.
Perímetro torácico: 91.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 80.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 90 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 18.80 centímetros.
Anchura máxima: 14.60 centímetros.
Índice cefálico: 77.60.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.70 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.03.
Módulo cefálico: 15.70.

CARA

Longitud mento-nasio: 13.60 centímetros.
Longitud mento-ocranio: 19.00 centímetros.
Altura nasio-ocranio: 5.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.30 centímetros.
Índice facial: 102.25 (?).
Índice fisonómico: 70.00.
Diámetro frontal mínimo: 9.95 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice nasal: 53.06.

BOCA

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 3.40 centímetros.
Índice auricular: 54.83.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 18 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 10 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 39 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher: 7 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba: (color, Tabla de Fisher): 7 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Muy escaso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Mediana.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y algo grueso.
Brazos: Cortos y algo gruesos, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.
Piernas: Cortas y gruesas, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y planos.
Hombros: Rectos y medianos.
Torax: Mediano, convexo, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Poco morena.
Pigmento: Muy escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 85 por minuto tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.

CASO NUM. 19.- FICHA DE IDENTIFICACION

Nombre: P. F. M.
Edad: Treinta y un años, aproximada.
Sexo: Masculino.
Estado civil: Casado.
Ocupación: Ferrocarrilero.
Lugar de nacimiento: Orizaba, Ver.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBE-FRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (28-II-1929).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 53 centímetros.
Busto sentado: 92.5 centímetros.
Braza: 1 metro 68 centímetros.
Peso. (Desnudo): 49 kilos, 500 gramos.
Anchura de hombros 33.5 centímetros.

Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (31-V-1930).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte, ALTLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

Perímetro torácico: 86 centímetros.
Perímetro abdominal: 72 centímetros.
Perímetro pélvico: 84 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 30 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 17.90 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 99.30.

Altura (Método de Hrdlicka): 13.95 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 86.80.
Módulo cefálico: 15.35.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.00 centímetros.
Longitud mente-erinio: 17.40 centímetros.
Altura nasio-erinio: 5.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.20 centímetros.
Índice facial: 90.90.
Índice fisonómico: 75.86.
Diámetro frontal mínimo: 9.30 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.20 centímetros.
Índice nasal: 56.15.

BOCA

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.80 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice auricular: 60.34.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 8 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Profusa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 12 de Martín. Color de la conjuntiva: Congestionada. (Roja.) Tamaño: Mediano.
Cara: Alargada.
Borde orbitario: No saliente. Mediano.

Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.

Porción ósea de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.

Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Medianas, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica, gibas frontales ligeramente marcadas.

Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Chico.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Débil.

Cabeza: Chica.

Cuello: Largo y delgado.

Brazos: Largos y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Manos: Largas y delgadas.

Pies: Grandes y huesosos.

Hombros: Rectos y medianos.

Tórax: Cilíndrico, enjuto, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.

Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Ligeramente encorvada adelante. Cifosis dorsal.

Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Abundante.

Vasos:

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 75 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: Poco visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (23-II-1929.)

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

CASO NUM. 20.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: A. M.

Edad: 23 años, aproximadamente.

Sexo: Masculino.

Ocupación: Jornalero.

Estado civil: Soltero.

Lugar de nacimiento: Hidalgo, Hgo.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (4-I-1927.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 70 centímetros.

Busto sentado: 84 centímetros.

Braza: 1 metro, 65 centímetros.

Peso (Desnudo): 70 kilos.

Anchura de hombros: 38 centímetros.

Perímetro torácico: 92 centímetros.

Perímetro abdominal: 78 centímetros.

Perímetro pélvico: 91 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 26.5 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 21.5 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 91 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.

Longitud máxima: 18.20 centímetros.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Anchura máxima: 15.40 centímetros.

Índice cefálico: 83.1.

Altura. (Método de Hrdlicka): 14.20 centímetros.

Índice medio cefálico de altura: 84.50.
Módulo cefálico: 15.93.

CARA.

Longitud mento-nasio: 12.70 centímetros.

Longitud mento-erinio: 18.50 centímetros.

Altura nasio-erinio: 6.95 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 13.80 centímetros.

Índice facial: 92.02

Índice fisonómico: 74.59

Diámetro frontal mínimo: 11.60 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.70 centímetros.

Anchura máxima: 4.00 centímetros.

Índice nasal: 70.17

BOCA

Anchura: 5.35

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.13 centímetros.

Anchura máxima: 3.73 centímetros.

Índice auricular: 60.84

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 17 kilos.

Mano Izquierda (presión en kilos): 10 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No Calvo: No
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher Carácter: Lacio
Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Mediana.
Borde orbitario: No saliente Mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz. Mediana, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande. Bien dibujada.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado, mediano.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas. lóbulos adherente.
Frente: Grande, con gibas frontales marcadas.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas
Musculatura: Bien desarrollada, relieves musculares marcados.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso, hundido entre los hombros.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y delgadas.

Pies: Grandes y planos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Bien desarrollado, convexo, con muy escaso depósito de tejido adiposo, TIPO ATLETA.
Abdomen: Tenso, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 86 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes. separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (24-VIII-1924).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

CASO NUM. 21.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: V. M.
Edad: Veintitres años aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Peluquero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEL FRETICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (1-nov.-1930.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro 69 centímetros.
Busto sentado: 89 centímetros.
Braza: 1 metro, 67 centímetros.
Peso (Desnudo): 59 kilos 500 gramos.
Anchura de hombros: 38 centímetros.
Perímetro torácico: 93 centímetros.
Perímetro abdominal: 84 centímetros.
Perímetro pélvico: 91.5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 86.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.10 centímetros.
Anchura máxima: 15.20 centímetros.
Índice cefálico: 83.90 centímetros.
Altura. (Método de Hrdlicka): 14.55 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 87.40
Módulo cefálico: 15.93.

CARA

Longitud mento-nasio: 13.50 centímetros.
Longitud mento-ocranio: 19.00 centímetros.
Altura nasio-ocranio: 6.50 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima 13 centímetros.
Índice facial: 103:84 (?)
Índice fisonómico: 68.42

Diámetro frontal mínimo: 11.00 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 7.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice nasal: 54.28

BOCA

Anchura: 5.30

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.80 centímetros.
Anchura máxima: 3.10 centímetros.
Índice Auricular: 45.58.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 22 kilos.
Mano izquierda: (presión en kilos): 18 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Hago notar que el índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 32 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter Lacio: Cano: No Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 10 de Fisher. Carácter: Lacio.
Distribución Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana, excavada.
Punta de la nariz: Ligeramente respingada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo arveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Grandes, bien implantadas, 16-bulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Excavado en la raíz de la nariz.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Algo largas y toscas (callosas).
Pies: grandes y huesosos.
Hombros: Caídos medianos.
Tórax: Amplio convexo con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos.

CASO NUM. 22.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas. De segunda.)

Nombre F. M.
Sexo: masculino.
Edad: Diecinueve años aproximadamente.
Ocupación: Panadero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HE-BEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda.

MEDIDAS

Estatuda: 1 metro, 65 centímetros.

Arterías: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 75 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin caracter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (10-nov-1931.)
Comienzo de la pubertad: De los trece a los catorce años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD. ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogantario indirecto.)

Busto sentado: 90 centímetros.
Braza: 1 metro, 69 centímetros.
Peso (Desnudo): 52 kilos.
Anchura de hombros: 30.5 centímetros.
Perímetro torácico: 73 centímetros.
Perímetro abdominal: 65 centímetros.
Perímetro pélvico: 83.5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 16 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 18.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 13.90 centímetros.
Anchura máxima: 13.90 centímetros.
Altura (Método de Hrdlicka): 14.20 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 83.80
Módulo cefálico: 16.03

CARA.

Longitud mento-nasio: 13.00 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 3.80 centímetros.
Anchura bi-zigomática, máxima: 13.40 centímetros.
Índice facial: 97.01
Índice fisonómico: 79.76
Diámetro frontal mínimo: 10.40 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 4.30 centímetros.
Índice nasal: 79.63

BOCA

Anchura: 5.20 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.50 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 58.46

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): No fué posible tomarla.
Mano izquierda: (Presión en kilos) no fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Dado el estado de agitación del enfermo no fué posible tomar la presión.

Inspeccion.

Color de la piel: (Tabla de Broca): 38 de Broca.
Pelo: (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Caracter: Lacio. Cano: No Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher). 6 de Fisher. Caracter: Lacio. Distribución Escaso.
Ojos. (Colos del irir, Tabla de Martín): 3 Martín Color de la Conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.

Borde orbitario: Saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Grande, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Roma, redondeada.
Boca: Chica. Bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe. Mandíbula inferior, con la rama ascendente izquierda más abultada.
Mentón: Afilado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Con implantación irregular. Íntegros, sin alteración.
Encías: Algo abultadas, con signos de gingivitis aguda.
Orejas: Grandes, bien implantadas, 16-bulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: La anotada en el maxilar inferior.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Grande.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Cortas y huesosas.
Pies: Planos, algo grandes.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Enjuto, cilindroide, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Algo encorvada adelante. Cifosis dorsal.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterías: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 89 por minuto, amplitud media, tensión media, ritmo.

Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (16-IX-1930.)
Comienzo de la pubertad: De los trece a los catorce años.

CASO NUM. 23.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: P. M.
Edad: Veinte años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA CATATONICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (29-VII-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 61 centímetros.
Busto sentado: 81 centímetros.
Brazo: 1 metro, 60 centímetros.
Peso: (Desnudo): 50 kilos, 600 gramos.

Anchura de hombros: 37 centímetros.
Perímetro torácico: 83 centímetros.
Perímetro abdominal: 75 centímetros.
Perímetro pélvico: 84 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 30.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 89.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Mesocéfaló.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento. Ha conservado su peso.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales. Ninguna

CONSTITUCION FISICA: Débil ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD. ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Longitud máxima: 19.20 centímetros
Anchura máxima: 14.40 centímetros.
Índice cefálico: 75.00
Altura (Método de Hrdlicka.): 13.70 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 81.50
Módulo cefálico: 15.76.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.30 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.00 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.40
Altura nasio-crinio: 5.70 centímetros.
Índice facial: (?)
Índice fisionómico: (?)
Diámetro frontal mínimo: 10.60 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.30 centímetros.
Altura máxima: 3.40 centímetros.
Índice nasal: 53:96.

BOCA

Anchura: 5.25 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.00 centímetros.
Índice auricular: 46.87.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.

Mano izquierda. (presión en kilos): 11 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Enferma muy agitada. Dado ese estado poca precisión en las medidas.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo: (Color, Tabla de Fisher: 6 de Fisher. Carácter: Lacio: Cano No Calvo: No.

Mostacho y barba: (Color, Tabla de Fisher): 32 de Fisher. Carácter: Lacio
Distribución: Escasa.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.

Borde orbitario: Poco saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Grande y blanda.

Porción ósea de la nariz: Mediana, recta.

Punta de la nariz: Afilada.

Boca: Algo grande, bien dibujada.

Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Afilado, ligeramente respingado.

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Enefas: Planas, sin alteración.

Orejas: Grandes, bien implantadas, 16-bulo adherente.

Frente: Chica, plana.

Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Ovulo infantil.

Desarrollo de la cara: Tipo masculino (infantil).

Esqueleto del cráneo: Chico.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Débil.

Cabeza: Chica.

Cuello: Largo y delgado.

Brazos: Largos y delgados, sin depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y delgadas, sin depósito de tejido adiposo.

Manos: Largas y huesosas.

Pies: Planos y huesosos.

Hombros: Caídos, medianos.

Torax: Cilíndroide, enjuto, enflaquecido. TIPO TISICO.

Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Encorvada adelante. Cifosis dorsal.

Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Más blanca que morena.

Pigmento: Escaso.

Vasos.

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media rítmico.

Venas: Poco visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (29-VII-1930).

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: Na la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 24.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos, no pensionistas de segunda.)

Nombre: F. S. R.
Edad: Treinta años, aproximadamente.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Estado civil: Soltero.
Lugar de nacimiento: Oaxaca, Oax.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (22-VI-1928).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 68 centímetros.
Busto sentado: 87 centímetros.
Braza: 1 metro, 67 centímetros.
Peso (Desnudo): 52 kilos.
Anchura de hombros: 34 centímetros.
Perímetro torácico: 81.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 71.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 83.5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 22.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 29 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 87 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.10 centímetros.
Anchura máxima: 15.00 centímetros.
Índice cefálico: 83.40.
Altura (Método de Hrdlicka): 14.50 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 87.6.
Módulo cefálico: 15.86.

CARA

Longitud mento-nasio: 12 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.20 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.65 centímetros.
Índice facial: 95.23.
Índice fisonómico: 69.50.
Diámetro frontal mínimo: 10.5 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice nasal: 70.37.

BOCA

Anchura: 5.80 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.15 centímetros.
Índice auricular: 51.63.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 18 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 19 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 32 de Broca.
Pelo. (Color Tabla de Fisher): 3 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 3 Fisher. Carácter: Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Amarillenta. Tamaño: Mediano.
Cara: Mediana.
Orde orbitario: No saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Regular, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Ventón: Redondeado.
Laringe: No prominente, Mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Muscultura: Débil.
Cabeza: Grande.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y delgadas.
Pies: Grandes y huesosos.
Hombros: Caídos, medianos.
Torax: Enjuto, cilindroide, enflaquecido, TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada adelante, con cifosis dorsal.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento. Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

CASO NUM. 25.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas. De primera.)

Nombre: A. M.
Edad: Treinta y cinco años.
Sexo: Masculino.
Ocupación: Jornalero.
Lugar de nacimiento: Monte Libano, Siria.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (11-22-1930).

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 58 centímetros.
Busto sentado: 87 centímetros.
Braza: 1 metro 62 centímetros.
Peso (Desnudo): 63 kilos.
Anchura de hombros: 38.5 centímetros.
Perímetro torácico: 90 centímetros.
Perímetro abdominal: 78 centímetros.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: Únicamente informan sus familiares que en el año 1928).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto).

Perímetro pélvico: 91 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 21 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 16.40 centímetros.
Anchura máxima: 13.40 centímetros.
Índice cefálico: 81.70.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.55 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 90.90.
Módulo cefálico: 14.45.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.40 centímetros.

Longitud mento-crinio: 19.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 7.00 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 14.50 centímetros.
Índice facial: 81.51.
Índice fisonómico: 74-74.
Diámetro frontal mínimo: 11.00 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 4.00 centímetros.
Índice nasal: 64.51.

BOCA

Anchura: 5.60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 4.10 centímetros.
Índice auricular: 68.33.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 23 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 21 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 10 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): 15 Fisher. Carácter Lacio. Distribución: Escasa.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 14 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Blanca y mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Algo grande, bien dibujada.
Labios: Medianamente gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón. Redondeado.
Laringe: No prominente. Mediana.
Dientes: Integros. Sin alteración. Bien implantados.
Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Chicas, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Grande, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo masculino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Fuerte, con relieves musculares bien marcados.
Cabeza: Aplastada en su parte superior.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas, algo huesosas.
Pies: Cortos y huesosos.
Hombros: Caídos ligeramente, medianos.
Torax: Amplio, convexo. TIPO ATLETA. Con poco depósito de tejido adiposo.
Abdomen: Tenso, con poco depósito de grasa.

Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Más blanca que morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos.
Arterias: Blandas y no visibles.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible. Medianos.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo masculino.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: El 22 de febrero de 1930.

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No hay caso (hombre).

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sano.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD. ESQUIZOTIMICO.

HERENCIA: Ninguna. (Dato tomado por interrogatorio indirecto).

CASO NUM. 26.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: M. F.
Edad: Veintiseis años, aproximadamente.

Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Estado civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: Monte Líbano, Siria.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (19-V-1927).

Índice medio cefálico de altura: 82.70.
Módulo cefálico: 15.26.

CARA

Longitud mento-nasio: 9.60 centímetros.

Longitud mento-crinio: 15.70 centímetros.

Altura nasio-crinio: 6.10 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.80 centímetros.

Índice facial: 75.00.
Índice fisonómico: 81.52.
Diámetro frontal mínimo: 9.80 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.20 centímetros.
Índice nasal: 64.00.

BOCA

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 2.80 centímetros.
Índice auricular: 46.66.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 12 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 10 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: Ligeramente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 65 centímetros.
Busto sentado: 91.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 64 centímetros.
Peso (Desnuda): 54 kilos, 200 gramos.
Anchura de hombros: 35.5 centímetros.
Perímetro torácico: 86 centímetros.
Perímetro abdominal: 73 centímetros.
Perímetro pélvico: 96 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20.6 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 84.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.40 centímetros.
Anchura máxima: 15.00 centímetros.
Índice cefálico: 86.20.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.40 centímetros.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
 Cara: Poco grande, redonda.
 Borde orbitario: Poco saliente.
 Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha.
 Porción ósea de la nariz Cóncava.
 Punta de la nariz: Ancha.
 Boca: Regular, bien dibujada.
 Labios: Superior más saliente que el inferior.
 Prognatismo alveolar: Ligeramente marcado.
 Mentón: Redondeado.
 Laringe: No prominente, mediana.
 Dientes: Integros, sin alteración.
 Encías: Planas, sin alteración.
 Orejas Chicas, bien implantadas con lóbulo adherente.
 Frente: Chica y plana.
 Perfil: Cóncavo.
 Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
 Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
 Esqueleto del cráneo: Mediano.
 Asimetrías: Ninguna.
 Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
 Esqueleto: Mediano.
 Articulaciones: Medianas.
 Musculatura: Fuerte.
 Cabeza: Chica.
 Cuello: Corto y grueso.
 Brazos: Largos y gruesos, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
 Piernas: Largas y gruesas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
 Manos: Chicas y toscas.
 Pies: Chicos, gruesos, planos.
 Hombros: Rectos, medianos.
 Torax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.

CASO NUM. 27.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: J. D. L. F.
 Edad: Treinta años aproximadamente.
 Sexo Femenino
 Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
 Columna vertebral: Recta.
 Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
 Pigmento: Poco abundante.
 Vasos.
 Arterias: No visibles, blandas.
 Pulsos: Frecuencia: 76 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
 Venas: No visibles.
 Desarrollo del pelo: Abundante.
 Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
 Tiroides: Sin alteración ostensible.
 Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
 Glándula mamaria: Tipo femenino, cafadas y medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (19-V-1927).
 Comienzo de la pubertad: A los trece años.
 Comienzo de la menopausa: No la tiene.
 Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
 Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
 Comienzo de la calvicie: No la tiene.
 Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
 Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

Estado civil: Soltera.
 Lugar de nacimiento: Real del Monte, Hgo.
 Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
 Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
 Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda (27-VI-1927).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 60 centímetros.
 Busto sentado: 87 centímetros.
 Braza: 1 metro, 43 centímetros.
 Peso (Desnuda): 59 kilos.
 Anchura de hombros: 36.5 centímetros.
 Perímetro torácico: 86.5 centímetros.
 Perímetro abdominal: 74.5 centímetros.
 Perímetro pélvico: 94.5 centímetros.
 Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24 centímetros.
 Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
 Circunferencia de la pierna izquierda: 30.5 centímetros.
 Longitud de la pierna izquierda: 84.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.
 Longitud máxima: 17.90 centímetros.
 Anchura máxima: 14.40 centímetros.
 Índice cefálico: 80.44.
 Altura (Método de Hrdlicka): 13.25 centímetros.
 Índice medio cefálico de altura: 81.80.
 Módulo cefálico: 15. 18.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.40 centímetros.
 Longitud mento-crinio: 16.00 centímetros.
 Altura nasio-crinio: 3.60 centímetros.
 Anchura bizigomática máxima: 13.00 centímetros.
 Índice facial: 95.38.
 Índice fisonómico: 81. 25.
 Diámetro frontal mínimo: 9.40 (?) centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.60 centímetros.
 Anchura máxima: 3.40 centímetros.
 Índice nasal: 60.71.

BOCA.

Anchura: 5.20 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.20 centímetros.
 Anchura máxima: 3.30 centímetros.
 Índice auricular: 53.22.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos: No fué posible tomarla).
 Mano izquierda (presión en kilos) No fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Las medidas, que se encuentran acompañadas de una interrogación indican que su toma fué delicada, por el estado de excitación que la exploración originó.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
 Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
 Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
 Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Ligeramente congestionada. Tamaño: Mediano.
 Cara: Chica.
 Borde orbitario: No saliente.
 Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha, blanda.
 Porción ósea de la nariz: Ligeramente desviada de la línea media, ancha.
 Punta de la nariz: Afilada.
 Boca: Grande, bien dibujada.
 Labios: Gruesos.
 Prognatismo alveolar: No existe.
 Mentón: Redondeado.
 Laringe: No prominente mediana.
 Dientes: Grandes, integros sin alteración.
 Encías: Planas, sin alteración.
 Orejas: Medianamente grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.
 Frente: Chica, plana.
 Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
 Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
 Esqueleto del cráneo: Mediano.
 Asimetrías: La anotada en la nariz.
 Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
 Esqueleto: Mediano.
 Articulaciones: Medianas.
 Musculatura: Mediana.
 Cabeza: Chica.
 Cuello: Corto y delgado.
 Brazos: Cortos y delgados, con depósito de tejido adiposo.
 Piernas: Cortas y delgadas, con depósito de tejido adiposo.
 Manos: Chicas y huesosas.
 Pies: Chicos y huesosos.
 Hombros: Rectos y medianos.

Torax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: no visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Exsten sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas y medianas.

CASO NUM. 28.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de primera.)

Nombre: M. B. C.
Edad: Cuarenta y dos años aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Telegrafista.
Estado Civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda (17-V-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro 63 centímetros.
Pusto sentado: 82.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 58 centímetros.
Peso (Desnuda): 60 kilos.
Anchura de hombros: 36.5 centímetros.
Perímetro torácico: 85.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 77 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (27-VI-1927).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD. ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 81.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 16.30 centímetros.
Anchura máxima: 13.20 centímetros.
Índice cefálico. 80.98.
Altura. (Método de Hrdlicka): 12.25 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.70.
Módulo cefálico: 12.91.

CARA.

Longitud mento-nasio: 10.00 centímetros.
Longitud mento-erinio: 17.20 centímetros.
Altura nasio-erinio: 7.20 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 11.90 centímetros.
Índice facial: 84.03.
Índice fisonómico: 69.18.
Diámetro frontal mínimo: 8.70 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.10 centímetros.

Índice nasal: 62.00

BOCA

Anchura: 4.90 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.50 centímetros.
Anchura máxima: 3.70 centímetros.
Índice auricular: 67.27.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 15 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 12 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: Medianamente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 5 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Toda la dentadura cariada.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Grande, con gibas frontales marcadas.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Forma de escudo amplio.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCIÓN.

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con regular depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con regular depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas (algo callosas).
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Torax: Amplio, Medianamente convexo, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 75 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (17-V-1925).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la pubertad: A los doce años.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
ATLETA.

CASO NUM. 29.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: N. A.
Edad: Veinticinco años aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: costurera.
Estado Civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda (8-VII-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro 68 centímetros.
Busto sentado: 81.5 centímetros.
Peso. (Desnuda): 59 kilos.
Braza: 1 metro, 45 centímetros.
Anchura de hombros: 37 centímetros.
Perímetro torácico: 84 centímetros.
Perímetro abdominal: 80 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 29.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.20 centímetros.
Anchura máxima: 14.00 centímetros.
Índice cefálico: 81.40.
Altura. (Método de Hrdlicka): 12.60 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 80.70.
Módulo cefálico: 14.60.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.00 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.00 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.00 centímetros.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue tomado por interrogatorio indirecto.)

Anchura bizigomática máxima: 12.50 centímetros.
Índice facial: 88.00
Índice fisonómico: 78.12.
Diámetro frontal mínimo: 9. 10 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 4.80 centímetros.
Anchura máxima: 3.30 centímetros.
Índice nasal: 68.75.

BOCA.

Anchura: 4.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.40 centímetros.
Índice auricular: 60. 71.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 8 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 5 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba: (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha, blanda.
Porción ósea de la nariz: Ligeramente ancha,
Punta de la nariz: Redondeada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.

Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Muscultura: Bien desarrollada, relieves musculares bien marcados.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y grueso.
Piernas: Cortas y gruesas, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Pies: Chicos y planos.
Hombros: Redondos, medianos.
Torax: Amplio, convexo, con poco depósito de tejido adiposo.
Abdomen: Poco tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena, con cicatrices de viruela.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.

CASO NUM. 30.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos, no pensionistas de segunda.)

Nombre: D. P.
Edad: Veinte y seis años aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado Civil: Casada.
Lugar de nacimiento Monterrey, N. L.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBE-FRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda (3-XII-1930).

Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, ritmo. Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (8-VII-1930).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fue recogido por interrogatorio indirecto.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 64 centímetros.
Busto sentado: 82 centímetros.
Braza: 1 metro, 64 centímetros.
Peso (Desnuda): 59 kilos, 500 gramos.
Anchura de hombros: 37 centímetros.
Perímetro torácico: 86 centímetros.
Perímetro abdominal: 76 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 21. centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.70 (?) centímetros.
Anchura máxima: 14.10 (?) centímetros.
Índice cefálico: 75.40.
Altura. (Método de Hrdlicka): 12.35 centímetros. (?)
Índice medio cefálico de altura: 73.51.
Módulo cefálico: 15.03.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.30 centímetros.
Longitud mento-crinio: 15.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 4.50 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.40 (?) centímetros.
Índice facial: 91.12.
Índice fisonómico: 78-48.
Diámetro frontal mínimo: 10.00 (?) centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.25 centímetros.
Índice nasal: 57.00.

BOCA.

Anchura: 5.00(?) centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.70 (?) centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 66.66.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): No fué posible tomarla.
Mano izquierda (presión en kilos): No fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Las medidas que se encuentran acompañadas de una interrogación, indican que su toma fué delicada por el estado de excitación que la exploración originó.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 7 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba: (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martin):

8 de Martin. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Redondeada.
Borde orbitario: Algo saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Angosta.
Porción ósea de la nariz: Angosta, mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Partido.
Laringe: Poco prominente, mediana.
Dientes Incisivos cariados.
Encías: Planas, sin alteración ostensible.
Orejas: Chicas, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Chica y casi plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Fuerte.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Bien desarrollada.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y algo grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Pies: Chicos y con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Hombros: Rectos y medianos.
Torax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Blanca.
Pigmento: Muy escaso.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, café, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (3-XII-1930).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la pubertad: A los catorce años.

CASO NUM. 31. FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: M. D. R. M.
Edad: Treinta años aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado Civil: Casada.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: Zamora, Mich.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (30-XI-1925).

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 58 centímetros.
Busto sentado: 83 centímetros.
Brazo: 1 metro, 61 centímetros.
Peso. (Desnuda): 60 kilos.
Anchura de hombros: 35 centímetros.
Perímetro torácico: 84 centímetros.
Perímetro abdominal: 75 centímetros.
Perímetro pélvico: 94 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 84 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué obtenido por interrogatorio indirecto.)

Longitud máxima: 17.40 centímetros.
Anchura máxima: 13.50 centímetros.
Índice cefálico: 77.50.
Altura. (Método de Hrdlicka): 12.10 centímetros (?).
Índice medio cefálico de altura: 78.25.
Módulo cefálico: 14.30.

CARA

Longitud mento-nasio: 10.40 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.20 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.80 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.30 centímetros.
Índice facial: 84.55.
Índice fisonómico: 71.51.
Diámetro frontal mínimo: 10.30 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 4.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice nasal: 74.46.

BOCA.

Anchura: 5.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 3.10 centímetros.
Índice auricular: 50.00

VIGOR.

Mano derecha (presión en kilos): 20 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 18 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Las medidas que se encuentran acompañadas de una interrogación, indican que su toma fué delicada, por el estado de agitación que la exploración originó.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 5 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: Medianamente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Redonda.
Borde orbitario: Bastante saliente
Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha y blanda.
Porción ósea de la nariz: Ancha.
Punta de la nariz: Redondeada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Grande, gibas frontales marcadas.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Músculatura: Fuerte.
Cabeza, Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con muy poco depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas y toscas (callosas).
Pies: Chicos y huesosos, planos.
Hombros: Rectos, medianos.
Torax: Amplio, convexo, con muy poco depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.
Abdomen: Tenso, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Poco abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, algo caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (30 XI-1925).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 32.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensonistas. Tranquilas, de segunda.)

Diámetro frontal mínimo: 9.20 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 2.60 centímetros.
Índice nasal: 48.14.

BOCA

Anchura: 4.60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.00 centímetros.
Índice auricular: 49.18.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 9 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 5 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 39 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): Algo de bozo.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: No saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: Mediana, no prominente.
Dientes: Faltan dos incisivos y dos premolares, debido a caries.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Perfil: Recto.
Frente: Amplia, casi plana.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.50 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 81.10.
Altura (Método de Hrdlicka): 12.40 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 77.00.
Módulo cefálico: 14.70.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.10 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.30 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.10 centímetros.
Índice facial: 91.73.
Índice fisonómico: 73.78.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Chico.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
M musculatura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto, delgado.
Brazos: Cortos y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Cilindroide, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO TÍPICO.
Abdomen: Flácido, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Ligeramente encorvada, cifosis dorsal.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Regular cantidad.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

CASO NUM. 33.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: L. V.
Edad: Veinticinco años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Casada.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.
Historia Clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (28-VI-1925.)

Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

VIGOR

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (9-XI-1928.)
Comienzo de la pubertad: A los doce años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 65 centímetros.
Busto sentado: 77 centímetros.
Braza: 1 metro, 60 centímetros.
Peso. (Desnuda): 67 kilos, 600 gramos.
Anchura de hombros: 36 centímetros.
Perímetro torácico: 83 centímetros.
Perímetro abdominal: 75 centímetros.
Perímetro pélvico: 94 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 21.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 38 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 81 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalos.
Longitud máxima: 18.10 centímetros.
Anchura máxima: 14.40 centímetros.
Índice cefálico: 79.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.35 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 73.00.
Módulo cefálico: 15.27.

CARA.

Longitud mento-nasio: 12.30 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.20 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.90 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.00 centímetros.
Índice facial: 94.61.
Índice fisonómico: 71.40.
Diámetro frontal mínimo: 10.20 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 2.90 centímetros.
Índice nasal: 48.33.

BOCA

Anchura: 4.90 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.90 centímetros.
Índice auricular: 63.93.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.
Mano izquierda (Presión en kilos): 12 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Ligeramente cano. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Ligeramente congestiona-da. Tamaño: Mediano.
Cara: Redonda.
Borde orbitario: No saliente, mediano.

Porción cartilaginosa de la nariz: Poco ancha, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Redondeada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Grande: Plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Pómulo derecho más saliente que el izquierdo.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
M musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y delgado.
Brazos: Cortos y algo delgados, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y algo gruesas, con muy poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas (callosas).
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Poco amplio, con escaso depósito de tejido adiposo. TIPO PÍPICO.
Abdomen: Poco tenso, con regular cantidad de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (VI-28-1924.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

CASO NUM. 34.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: H. V.
Edad: Veinte años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Soltera.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: Sonora, Son.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (19-VIII-1922.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 64 centímetros.
Busto sentado: 88.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 63 centímetros.
Peso (Desnuda): 48 kilos.
Anchura de hombros: 33.5 centímetros.
Perímetro torácico: 76 centímetros.
Perímetro abdominal: 68 centímetros.
Perímetro pélvico: 82 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 17.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 27 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.50 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana.
PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Índice cefálico: 81.10.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.15 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.60.
Módulo cefálico: 14.95.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.40 (?) centímetros.
Longitud mento-ocrinio: 17.60 centímetros.
Altura nasio-ocrinio: 5.20 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.20 (?) centímetros.
Índice facial: 101.63 (?).
Índice fisonómico: 69.31.
Diámetro frontal mínimo: 9.80 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice nasal: 64.28.

BOCA

Anchura: 4.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.30 centímetros.
Anchura máxima: 2.90 centímetros.
Índice auricular: 46.03.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): No fué posible tomarla.
Mano izquierda (presión en kilos): No fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Las medidas que se encuentran acompañadas de una interrogación, indican que su toma fué delicada, por el estado de agitación que la exploración originó.

El índice facial es superior a cien.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 32 de Broca.
Pelo. (Color, tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Ligeramente: Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Congestionada. Tamaño: Mediano.
Cara: Chica.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.
Frente: Grande, gibas frontales marcadas.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoides alargado.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Chico.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.

Pies: Algo grandes y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Enjuto, cilindroide, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
TIPO TISICO.
Abdomen: Tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Ligeramente encorvada adelante. Cifosis dorsal.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 76 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (19-VIII-1922.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 35.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: C. M.
Edad: Treinta y cinco años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Casada.
Ocupación: Empleada de telégrafos.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (27-XI-1930.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 65 centímetros.
Busto sentado: 87.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 64 centímetros.
Peso. (Desnuda): 62 kilos, 300 gramos.
Anchura de hombros: 37.5 centímetros.
Perímetro torácico: 85 centímetros.
Perímetro abdominal: 76 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 21 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.00 centímetros.
Anchura máxima: 14.40 centímetros.
Índice cefálico: 82.20.
Altura (Método de Hrdlicka): 12.75 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 78.70.
Módulo cefálico: 15.05.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.30 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.80 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.50 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.70 centímetros.
Índice facial: 88.97.
Índice fisonómico: 71.34.

Diámetro frontal mínimo: 9.00 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice nasal: 76.00.

BOCA

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.90 centímetros.
Anchura máxima: 3.20 centímetros.
Índice auricular: 54.23.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 14 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 10 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 38 de Broca.
Pelo. (Color, tabla de Fisher): 27 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Ligeramente respingada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Pronatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulos adherente.
Frente: Chica y plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Escudo angosto.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
M musculatura: Bien desarrollada, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y con algo de depósito de tejido adiposo.
Pies: Chicos y planos, con depósito de tejido adiposo.
Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

CASO NUM. 36.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: L. E. de P.
Edad: Cuarenta y dos años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado civil: Casada.
Lugar de nacimiento: Tapachula, Chiapas.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (8-III-1928.)

Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (27-XI-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte, ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 63.5 centímetros.
Busto sentado: 86.5 centímetros.
Braza: 1 metro 56 centímetros.
Peso (Desnuda): 47 kilos, 600 gramos.
Anchura de hombros: 33.5 centímetros.
Perímetro torácico: 76 centímetros.
Perímetro abdominal: 69 centímetros.
Perímetro pélvico: 81 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 27.5 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 79 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 17.70 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 80.20.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.30 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 83.10.
Módulo cefálico: 15.66.

CARA

Longitud mento-nasio: 10.80 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 7.60 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.30 centímetros.
Índice facial: 87.96.
Índice fisonómico: 66.84.
Diámetro frontal mínimo: 9.70 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 4.30 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice nasal: 81.39.

BOCA.

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.00 centímetros.
Índice auricular: 52.63.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 15 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 12 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Abundante. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Algo grande.

Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Blanca.

Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Chico y redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Faltan todos los molares, los caninos y dos incisivos.
Encías: Integra, sin alteración, planas.
Orejas: Chicas, bien implantadas con lóbulo adherente.
Frente: Grande, casi plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Chica.
Cuello: Algo largo.
Brazos: Largos y delgados, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Casi rectos medianos.
Tórax: Cilindroide, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: Poco visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante, entrecano.

Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (8-III-1928.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.

CASO NUM. 37. FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: A. M.
Edad: Cuarenta años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Casada.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: Estado de México, no precisa de dónde.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (6-XII-1928.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 59 centímetros.
Busto sentado: 88 centímetros.
Braza: 1 metro, 58 centímetros.
Peso (desnuda): 59 kilos, 300 gramos.
Anchura de hombros: 36.5 centímetros.
Perímetro torácico: 86 centímetros.
Perímetro abdominal: 80 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 26 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 86.5 centímetros.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. ASTENICA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Su abuelita y dos tías son neurópatas.

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 17.70 centímetros.
Anchura máxima: 13.80 centímetros.
Índice cefálico: 77.90.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.65 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 86.40.
Módulo cefálico: 15.05.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.00 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.60 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.60 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.50 centímetros.
Índice facial: 88.00.
Índice fisonómico: 71.02.
Diámetro frontal mínimo: 9.40 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice nasal: 70.58.

BOCA.

Anchura: 5.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.20 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Índice auricular: 61.29.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 20 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 18 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Ligeramente. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, tabla de Fisher): Algo de bozo.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 6 de Martín. Color de la conjuntiva: Azulada. Tamaño: Mediano.

Cara: Grande.

Borde orbitario: No saliente, mediano.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha, blanda.

Porción ósea de la nariz: Redondeada.

Boca: Grande, bien dibujada.

Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica y plana.

Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Escudo amplio.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.

Esqueleto del cráneo: Grande.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Mediana.

Cabeza: Grande.

Cuello: Corto y grueso.

Brazos: Largos y gruesos, con muy poco depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y gruesas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Manos: Grandes y toscas (callosas).

Huesos: Grandes y huesosos.

Hombros: Rectos y medianos.

Tórax: Amplio, convexo, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad. TIPO ATLETA.

Abdomen: Poco tenso, con depósito de tejido adiposo en regular cantidad.

Columna vertebral: Recta.

Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Poco abundante.

Vasos:

Arterias: No visibles, blandas

Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico

Venas: Poco visibles

Desarrollo del pelo: Abundante

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (6-XII-1928.)

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No la tiene.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. **ATLETA.**

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 38.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de Segunda.)

Nombre: D. Z.

Edad: Treinta y dos años, aproximadamente.

Sexo: Femenino.

Estado civil: Soltera.

Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Lugar de nacimiento: México, D. F.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (5-VIII-1921.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 53.5 centímetros.

Busto sentado: 80.5 centímetros.

Braza: 1 metro, 51 centímetros.

Peso. (Desnuda): 43 kilos.

Anchura de hombros: 33.5 centímetros.

Perímetro torácico: 76 centímetros.

Perímetro abdominal: 65 centímetros.

Perímetro pélvico: 82 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 21 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 18 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 27.5 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 79.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.

Longitud máxima: 18.50 centímetros.

Anchura máxima: 14.30 centímetros.

Índice cefálico: 77.30.

Altura (Método de Hrdlicka): 12.30 centímetros.

Índice medio cefálico de altura: 75.00.

Módulo cefálico: 15.03.

CARA

Longitud mento-nasio: 10.60 centímetros.

Longitud mento-crinio: 17.00 centímetros.

Altura nasio-crinio: 6.40 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 11.80 centímetros.

Índice facial: 89.83.

Índice fisonómico: 69.41.

Diámetro frontal mínimo: 10.40 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 4.70 centímetros.

Anchura máxima: 3.40 centímetros.

Índice nasal: 72.34.

BOCA

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.50 centímetros.

Anchura máxima: 3.70 centímetros.

Índice auricular: 56.92.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): No fué posible tomarla.

Mano izquierda (presión en kilos): No fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

La presión no fué posible tomarla por el estado de excitación que dicha exploración originó.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: Ligeramente. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color Tabla de Fisher): No hay caso.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 6 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.

Cara: Grande.

Borde orbitario: No saliente. Mediano.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha.

Porción ósea de la nariz: Mediana.

Punta de la nariz: Redondeada.

Boca: Grande, bien dibujada.

Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica, plana.

Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto: del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cuello: Largo y delgado.
Cabeza: Grande.
Brazos: Largos y delgados, con regular cantidad de depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con regular cantidad de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas, toscas (callosas).
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Enjuto, cilindroide, con escaso depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Poco tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 80 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

CASO NUM. 39.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de segunda.)

Nombre: L. R.
Edad: Veintiocho años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Soltera.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia, Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBE-FRENICA.

Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (5-VIII-1921.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (12-III-1930.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 53 centímetros.
Busto sentado: 83.5 centímetros.
Braza: 1 metro, 52 centímetros.
Peso (Desnuda): 48 kilos.
Anchura de hombros: 33 centímetros.
Perímetro torácico: 76 centímetros.
Perímetro abdominal: 68.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 83 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 28 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 79 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.20 centímetros.
Anchura máxima: 15.40 centímetros.
Índice cefálico: 84.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.20 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 72.70.
Módulo cefálico: 15.60.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.00 centímetros.
Longitud mento-criño: 18.70 centímetros.
Altura nasio-criño: 7.70 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.80 centímetros.
Índice facial: 85.93.
Índice fisonómico: 68.44.
Diámetro frontal mínimo: 9.10 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 4.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice nasal: 76.59.

BOCA.

Anchura: 4.60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.00 centímetros.
Anchura máxima: 3.40 centímetros.
Índice auricular: 56.66.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 12 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 9 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 9 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): Algo de bozo.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 11 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: Saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.

Porción ósea de la nariz: mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Grandes, con implantación defectuosa, íntegros.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, lóbulos adherentes.
Frente: Grande, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Mediana.
Cuello: Algo grueso y largo.
Brazos: Algo largos, y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Algo largas, delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas; los dedos con tendencia hipocrática.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Caídos, medianos.
Tórax: Enjuto, cilindroide, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Poco abundante.

Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 75 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (12-III-1930.)

CASO NUM. 40.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas de segunda.)

Nombre: C. M.
Edad: Treinta y cuatro años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado civil: Casada.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Lugar de nacimiento: Coahuila, Coah.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (23-IV-1930.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 60 centímetros.
Busto sentado: 85 centímetros.
Peso (Desnuda): 60 kilos.
Anchura de hombros: 33 centímetros.
Perímetro torácico: 90 centímetros.
Perímetro abdominal: 77.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 29.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 86 centímetros.

Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 18.30 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 77.50.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.40 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.20.
Módulo cefálico: 15.30.

CARA.

Longitud mento-nasio: 10.50 centímetros.
Longitud mento-ocranio: 17.20 centímetros.
Altura nasio-ocranio: 6.70 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 15.00 centímetros.
Índice facial: 70.00.
Índice fisonómico: 87.20.
Diámetro frontal mínimo: 9.60 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.20 centímetros.
Índice nasal: 62.74.

BOCA

Anchura: 4.20 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice auricular: 61.40.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 14 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 11 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES
NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Ligeramente ondulado. Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Grande.
Borde orbitario: No saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
ragnatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, 16-bulo adherente.
Frente: Chica, plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Fuerte, bien desarrollada.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y algo grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con regular cantidad de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y gruesas, con regular cantidad de tejido adiposo.
Manos: Chicas y toscas.
Pies: Chicos y huesosos.

Hombros: Rectos y medianos.
Tórax: Amplio, convexo, musculado, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Algo morena.
Pigmento: Muy escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 76 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (23-IV-1930.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CASO NUM. 41.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. Pensionistas de segunda. Neuro-sífilis.)

Nombre: C. U. de S.
Edad: Cuarenta y dos años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado civil: Casada.
Lugar de nacimiento: Guanajuato, Gto.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (29-III-1929.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 52 centímetros.
Busto sentado: 81 centímetros.
Braza: 1 metro, 48 centímetros.
Peso (Desnuda): 46 kilos, 600 gramos.
Anchura de hombros: 32.5 centímetros.
Perímetro torácico: 76 centímetros.
Perímetro abdominal: 65 centímetros.
Perímetro pélvico: 82 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 25 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 17.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 26 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 79 centímetros.

CABEZA

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 19.40 centímetros.
Anchura máxima: 14.50 centímetros.
Índice cefálico: 74.70.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.80 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 81.20.
Módulo cefálico: 15.90.

CARA

Longitud mento-nasio: 11.60 centímetros.
Longitud mento-crinio: 18.40 centímetros.
Altura nasio-crinio: 5.80 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 11.70 centímetros.
Índice facial: 99.14.
Índice fisonómico: 63.53.

Diámetro frontal mínimo: 9.30 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.50 centímetros.
Índice nasal: 68.62.

BOCA

Anchura: 5.30 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 56.92.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 23 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 19 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Cano: Abundante. Calvo: No. Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Alargada.
Borde orbitario: No saliente.
Percepción cartilaginosa de la nariz: Algo grande, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Roma.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente.
Dientes: Grandes, amarillentos, caries en la mayor parte de las muelas.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Grande y plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida, aunque flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Muscultura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Largo, algo delgado.
Brazos: Cortos y delgados, con escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y delgadas, con escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Plano, enjuto, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO.

Piel: Poco morena.
Pigmento: Escaso.
Vasos:
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 74 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: Poco visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante: entrecano.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

CASO NUM. 42.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. Pensionistas de segunda.)

Nombre: O. C.
Edad: Treinta y ocho años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado civil: Casada.
Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (27-I-1927.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 53 centímetros.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (29-III-1929.)
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.


TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Busto sentado: 84 centímetros.
Braza: 1 metro, 52 centímetros.
Peso (Desnuda): 50 kilos.
Anchura de hombros: 32.5 centímetros.
Perímetro torácico: 78 centímetros.
Perímetro abdominal: 65 centímetros.
Perímetro pélvico: 82 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 17.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 28 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 79 centímetros.

CABEZA

Deformación: Braquicefalo.
Longitud máxima: 18.20 centímetros.



Anchura máxima: 15.50 centímetros.
Índice cefálico: 85.16.
Altura (Método de Hrdlicka): 13.50 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 79.30.
Módulo cefálico: 15.71.

CARA.

Longitud mento-nasio: 10.70 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.00 centímetros.

Altura nasio-crinio: 5.30 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.50 centímetros.

Índice facial: 78.51.
Índice fisonómico: 84.37.
Diámetro frontal mínimo: 10.20 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.40 centímetros.
Índice nasal: 62.96.

BOCA.

Anchura: 4.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 66.66.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 21 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 22 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio. Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.

Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 6 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.
Borde orbitario: No saliente, mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana.

Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.

Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: Ligeramente marcado.

Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Faltan todas las piezas dentarias.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica, casi plana.

Perfil: Ligeramente excavado a nivel de la raíz de la nariz.

Contorno frontal de la cara: Ovoide, corta.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.

Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Débil.

Cabeza: Chica, aplastada por el vértex.

Cuello: Largo y delgado.

Brazos: Largos y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Manos: Medianas.

Pies: Medianos.

Hombros: Caídos, medianos.

Tórax: Enjuto, cilíndrico, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.

Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Recta.

Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Blanca.

Pigmento: Muy escaso.

Vasos:

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (27-I-1927.)

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: No la tiene.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

CASO NUM. 43.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. Pensionistas de segunda.

Nombre: A. D.

Edad: Cincuenta y dos años, aproximadamente.

Sexo: Femenino.

Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Estado civil: Soltera.

Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: PSICOSIS MANIACO DEPRESIVA.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda: (7-VI-1927.)

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 58 centímetros.

Busto sentado: 86 centímetros.

Braza: 1 metro, 57 centímetros.

Peso (Desnuda): 59 kilos.

Anchura de hombros: 33 centímetros.

Perímetro torácico: 86 centímetros.

Perímetro abdominal: 79 centímetros.

Perímetro pélvico: 94 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 22 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 80 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.

Longitud máxima: 19.20 centímetros.

Anchura máxima: 15.30 centímetros.

Índice cefálico: 79.63.

Altura. (Método de Hrdlicka): 13.75 centímetros.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Índice medio cefálico de altura: 79.50
Módulo cefálico: 16.08.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.30 centímetros.

Longitud mento-crinio: 19.30 centímetros.

Altura nasio-crinio: 7.00 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 13.30 centímetros.

Índice facial: 92.48.

Índice fisonómico: 68.95.

Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.40 centímetros.

Anchura máxima: 3.70 centímetros.

Índice nasal: 68.51.

BOCA

Anchura: 4.80 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 6.00 centímetros.

Anchura máxima: 3.00 centímetros.

Índice auricular: 50.00

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 17 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 17 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA:

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.

Cano: Medianamente. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Ligeramente congestionada. Tamaño: Mediano.

Cara: Redonda y grande.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.

Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.

Boca: Chica, bien dibujada.

Labios: Delgados.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Faltan la mayor parte de las piezas dentarias.

Encías: Con algo de piorrea.

Frente: Grande y plana.

Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.

Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.

Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Mediana.

Cabeza: Chica.

Cuello: Corto y grueso.

Brazos: Cortos y gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.

Piernas: Cortas y gruesas con poco depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas y con depósito de tejido adiposo.

Pies: Chicos, planos y con depósito de tejido adiposo.

CASO NUM. 44. FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: M. E. A.

Edad: Cuarenta años aproximadamente.

Sexo: Femenino.

Hombros: Rectos, medianos.
Tórax: Amplio, convexo, con depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Escaso.

Vasos.

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo femenino, cafadas medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (7-VI-1927).

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: A los cuarenta y siete años.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: CICLOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Estado Civil: Soltera.

Lugar de nacimiento: México, D. F.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (13-V-1926.)

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 67 centímetros.

Busto sentado: 85 centímetros.

Braza: 1 metro, 65 centímetros.

Peso (Desnuda): 63 kilos.

Anchura de hombros: 37 centímetros.

Perímetro tóxico: 93 centímetros.

Perímetro abdominal: 88 centímetros.

Perímetro pélvico: 82 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 22 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 87.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Mesocéfalo.

Longitud máxima: 18.00 centímetros. (?)

Anchura máxima: 14.10 centímetros.

Índice cefálico: 79.44.

Altura. (Método de Hrdlicka): 12.75 centímetros.

Índice medio cefálico de altura: 77.30

Módulo cefálico. 14.95.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.60 centímetros. (?)

Longitud mento-crinio: 16.80 centímetros.

Altura nasio-crinio: 5.20 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 11.50 centímetros.

Índice facial: (?).

Índice fisonómico: 62.50.

Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.10 centímetros.

Anchura máxima: 3.40 centímetros.

Índice nasal: 66.66.

BOCA

Anchura: 5.00 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.30 centímetros.

Anchura máxima: 3.20 centímetros.

Índice auricular: 60.37.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 11 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 9 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Enferma muy agitada. Poca precisión en las medidas.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio.

Cano: Medianamente. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.

Ojos. (Tabla de Martín, color del iris): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Normal.

Cara: Mediana.

Borde orbitario: No saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Blanda, mediana.

Porción ósea de la nariz: Mediana.

Punta de la nariz: Afilada.

Boca: Grande, bien dibujada.

Labios: Gruesos.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente.

Dientes: Falta una gran molar. Las demás cariadas.

Encías: Integrales, sin alteración, planas.

Orejas: Grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.

Frente: Chica y plana.

Perfil: Recto.

Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.

Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.

Esqueleto: Mediano.

Articulaciones: Medianas.

Musculatura: Mediana.

Cabeza: Mediana.

Cuello: Corto y mediano.

Brazos: Cortos y medianos con poco depósito de tejido adiposo.

Piernas: Cortas y medianas, con poco depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas.

Pies: Chicos y planos.

Hombros: Rectos, medianos.

Torax: Mediano, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO PICNICO.
Abdomen: Medianamente tenso con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Delgada, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Pigmento: Escaso.
Vasos.

Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

CASO NUM. 45.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de segunda.)

Nombre: J. B.
Edad: Cuarenta y siete años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado Civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: Toluca, México.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (18-X-1929).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 60 centímetros.
Busto sentado: 89.5 centímetros.
Peso. (Desnuda). 45 kilos.
Anchura de hombros: 30.5 centímetros.
Perímetro torácico: 78 centímetros.
Perímetro abdominal: 63 centímetros.
Perímetro pélvico: 76 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 20 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18 centímetros.

Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (13-V-1926).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana, PICNICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

Circunferencia de la pierna izquierda: 27 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda. 79.5 centímetros.

CABEZA

Deformación: Dolicocefalo.
Longitud máxima: 19.60.
Anchura máxima: 14.30 centímetros.
Índice cefálico: 72.95.
Altura. (Método de Hrdlicka): 14.35 centímetros (?).
Índice medio cefálico de altura: 84.90.
Módulo cefálico: 16.08.

CARA

Longitud mento-nasio: 12.00 centímetros.
Longitud mento-ocrinio: 18.00 centímetros.
Altura nasio-ocrinio: 6.00 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 11.40 centímetros.
Índice facial: (?).
Índice fisonómico: 63.33.
Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 6.10 centímetros.

Anchura máxima: 3.10 centímetros.
Índice nasal: 50.81.

BOCA.

Anchura: 5.10 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.90 centímetros.
Anchura máxima: 4.00 centímetros.
Índice auricular: 67.79.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 10 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 7 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

Enferma muy agitada. Poca precisión en las medidas.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 5 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: Ligeramente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Tabla de Martín, color del iris): 7 de Martín, color del iris: 7 de Martín. Color de la conjuntiva: Ligeramente congestionada. Tamaño: Mediano.
Cara: Ligeramente alargada.
Borde orbitario: Ligeramente saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Blanca.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Delgados.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Faltan varios premolares, uno superior y otro inferior.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Grandes, bien implantadas lóbulos adherente.
Frente: Chica y plana.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácido.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Flácida.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Largas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Caídos y medianos.
Torax: Enjuto, cilindroide, sin depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido, sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada, cifosis dorsal.
Pélvis: Estrecha.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Poco morena.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante entre cano, abundante velo en las piernas y en los órganos genitales.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Uterero infantil.
Tiroides: Aparentemente normal.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino muy poco desarrollada, y algo caída.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (18-X-1929).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la pubertad: A los catorce años.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

**CONSTITUCION FISICA: ASTENICA.
DISPLACIA MASCULINSMO.**

CASO NUM. 46.- FICHA DE IDENTIFICACION

(**Paellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas. De segunda.**)

Nombre: C. T.
Edad: Veintiséis años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado Civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: Mérida, Yuc.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia Clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (15-1-1921).

MEDIDAS.

Estatura: 1 metro, 54 centímetros.
Busto sentado: 81.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 53 centímetros.
Peso. (Desnuda): 50 kilos.
Anchura de hombros: 33.5 centímetros
Perímetro torácico: 76.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 67 centímetros.
Perímetro pélvico: 82 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 21.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 18.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 27 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 79.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.30 centímetros.
Anchura máxima: 14.90 centímetros.
Índice cefálico: 81.42.
Altura. (Método de Hrdlicka): 12.75 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 76.80
Módulo cefálico: 15.31.

CARA.

Longitud mento-nasio: 11.00 centímetros.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ES QUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Longitud mento-crinio: 16.60 centímetros.
Altura naso-crinio: 5.60 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.70 centímetros.
Índice facial: 86.29.
Índice fisonómico: 76.50.
Diámetro frontal mínimo: 9.70 centímetros.

NARIZ

Altura al nasio: 5.60 centímetros.
Anchura máxima: 3.30 centímetros.
Índice nasal: 58.92.

BOCA

Anchura: 4.60 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.30 centímetros.
Índice auricular: 61.07.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 15 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 17 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: No. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.
Cara: Alargada.
Borde orbitario: No saliene.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ligeramente convexa.
Porción ósea de la nariz: Delgada, mediana.
Punta de la nariz: Afilada.

Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: Poco prominente.
Dientes: Grandes, íntegros.
Encías: Sin alteración, planas.
Orejas: Algo grandes, bien implantadas, con lóbulo adherente.
Frente: Grande y plana.
Perfil: Casi recto.
Contorno frontal de la cara, Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Chico.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Flácida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Largo y delgado.
Brazos: Largos y delgados, sin depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, sin depósito de tejido adiposo.
Manos: Algo largas y huesosas.
Pies: Algo grandes y huesosos.
Hombros: Rectos, medianos.
Torax: Plano, algo enjuto, sin depósito de tejido adiposo.
TIPO TISICO.
Abdomen: Flácido y sin depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Encorvada adelante, cifosis dorsal.
Pélvis: Mediana.
SUPERFICIE DEL CUERPO
Piel: Morena.

CASO NUM. 47.- FICHA DE IDENTIFICACION

(**Paellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.**)

Nombre: J. M.
Edad: Treinta y un años aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado Civil: Casada.
Lugar de nacimiento: Ixtlahuaca, Edo. de México.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Pigmento: Regular cantidad.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 82 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Escasas y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, cafadas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (15-1-1921).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: ASTENICA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué recogido por interrogatorio indirecto.)

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.
Historia Clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (3-XII-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 75 centímetros.
Busto sentado: 86.5 centímetros.
Brazo: 1 metro, 65 centímetros.
Peso. (Desnuda) 74 kilos.
Anchura de hombros: 36.5 centímetros.
Perímetro torácico: 88 centímetros.
Perímetro abdominal: 83 centímetros.

Perímetro pélvico: 95.5 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 24.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 32 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 86 centímetros.

CABEZA

Deformación: Mesocéfaló.
Longitud máxima: 18.20 centímetros.
Anchura máxima: 14.00 centímetros.
Índice cefálico: 76.92.
Altura. (Método de Hrdlicka): 13.25 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 82.30.
Módulo cefálico: 15.15.

CARA

Longitud mento-nasío. 12.00 centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.80 centímetros.
Altura nasío-crinio: 5.80 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.60 centímetros.
Índice facial: 95.23.
Índice fisonómico: 70.78.
Diámetro frontal mínimo: 10.00 centímetros.

NARIZ

Altura al nasío: 5.10 centímetros.
Anchura máxima: 4.00 centímetros.
Índice nasal: 78.43.

BOCA

Anchura: 5.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 6.10 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 59.01.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 6 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 12 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel (Tabla de Broca): 26 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 6 de Fisher. Carácter: Lacio.

Cano: Ligeramente. Calvo: No.
Mostacho y barba: (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Tabla de Martín, color del iris): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.

Cara: Redonda.
Borde orbitario: Mediano.
Porción cartilaginosa de la nariz: Ligeramente ancha, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.
Punta de la nariz: Ligeramente chata.
Boca: Grande, bien dibujada.
Labios: Gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Redondeado.
Laringe: No prominente, mediana.
Dientes: Integros, sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Chicas, bien implantadas con lóbulo adherente.
Frente: Chica y plana.
Perfil: Recto.
Contorno frontal de la cara: Escudo amplio.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Grande.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION.

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y grueso.
Brazos: Cortos y gruesos, con escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y algo delgadas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y con escaso depósito de tejido adiposo.
Pies: Chicos y con escaso depósito de tejido adiposo.
Hombros: Rectos, medianos.
Torax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.
Abdomen: Flácido, con regular cantidad de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena clara.
Pigmento: Poco Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 79 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS.

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (3-XII-1930).
Comienzo de la menopausa: No la tiene.

CASO NUM. 48.- FICHA DE IDENTIFICACION.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: A. A.
Edad: Veintitres años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.
Estado Civil: Casada.
Lugar de nacimiento: Michoacán, Mich.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (14-VI-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 63 centímetros.
Busto sentado: 88 centímetros.
Brazo: 1 metro, 62 centímetros.
Peso. (Desnuda): 63 kilos 100. gramos.
Anchura de hombros: 36.5 centímetros.
Perímetro torácico: 88.5 centímetros.
Perímetro abdominal: 75.5 centímetros.
Perímetro pélvico: 95 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 20 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 33.5 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 85 centímetros.

Comienzo de la puberdad: A los trece años.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales. Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

CABEZA

Deformación: Braquicéfalo.
Longitud máxima: 18.10 centímetros.
Anchura máxima: 14.20 centímetros.
Índice cefálico: 78.40.
Altura. (Método de Hrdlicka): 13.35 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 86.10.
Módulo cefálico: 15.21.

CARA

Longitud mento-nasío: 11.00. centímetros.
Longitud mento-crinio: 17.30 centímetros.
Altura nasío-crinio: 6.30 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 11.40 centímetros.
Índice facial: 96.49.
Índice fisonómico: 65.89.
Diámetro frontal mínimo: 9.30 centímetros.

NARIZ

Altura al nasío: 4.50 centímetros.
Anchura máxima: 3.10 centímetros.
Índice nasal: 68.88.

BOCA

Anchura: 4.80. centímetros.

OREJA IZQUIERDA.

Altura máxima: 5.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.60 centímetros.
Índice auricular: 63.15.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): No fué posible tomarla.

Mano izquierda (presión en kilos): No fué posible tomarla.

OBSERVACIONES ESPECIALES

La presión no fué posible tomarla, por el estado de excitación que dicha exploración originó.

INSPECCION

Color de la piel (Tabla de Broca): 26 de Broca.

Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.

Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.

Ojos. (Tabla de Martín, color del iris): 4 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.

Cara: Chica.

Borde orbitario: No saliente, mediano. Porción cartilaginosa de la nariz: Mediana, blanda.

Porción ósea de la nariz: Ligeramente hundida.

Punta de la nariz: Redondeada, respingada.

Boca: Chica, bien dibujada.

Labios: Gruesos.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado

Laringe: No prominente, mediana.

Dientes: Integros, sin alteración.

Encías: Planas, sin alteración.

Orejas: Chicas, bien implantadas, lóbulo adherente.

Frente: Chica, plana.

Perfil: Excavado, en la raíz de la nariz.

Contorno frontal de la cara: Ovoide corta.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino.

Esqueleto del cráneo: Mediano.

Asimetrías: Ninguna.

Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.

Esqueleto: Mediano.

Musculatura: Fuerte, relieves musculares bien marcados.

Cabeza: Chica.

Cuello: Largo y delgado.

Brazos: Largos y gruesos, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Piernas: Largas y gruesas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Manos: Chicas y toscas (callosas).

Pies: Chicos y huesosos.

Hombros: Ligeramente caídos, medianos.

Torax: Amplio, convexo, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO ATLETA.

Abdomen: Tenso, con muy escaso depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Recta.

Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.

Pigmento: Abundante.

Vasos.

Arterias: No visibles, blandas.

Pulso: Frecuencia: 87 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.

Venas: No visibles.

Desarrollo del pelo: Abundante.

Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos

Tiroides: Sin alteración ostensible.

Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.

Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (14-VI-1930).

Comienzo de la pubertad: A los trece años.

Comienzo de la menopausa: Aun no la tiene.

Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Fuerte. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

CASO NUM. 49.- FICHA DE IDENTIFICACION.

NARIZ.

Altura al nasio: 5.10 centímetros.
Anchura máxima: 4.10 centímetros.
Indice nasal: 80.39

BOCA

Anchura: 5.70 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.90 centímetros.
Anchura máxima: 3.80 centímetros.
Indice auricular: 64.40.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 4 kilos.

Mano izquierda (presión en kilos): 4 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel, (tabla de Broca): 21 de Broca.

Pelo. (Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.

Cano: No. Calvo: No.

Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.

Ojos. (Tabla de Martín, color del iris): 2 de Martín. Color de la conjuntiva: Normal. Tamaño: Mediano.

Cara: Grande.

Borde orbitario: Poco saliente.

Porción cartilaginosa de la nariz: Ancha.

Porción ósea de la nariz: Chica, cóncava.

Punta de la nariz: Algo aplastada.

Boca: Grande, bien dibujada.

Labios: Gruesos.

Prognatismo alveolar: No existe.

Mentón: Redondeado.

Laringe: No prominente.

Dientes: Integros.

Encías: Planas.

Orejas: Grandes, bien implantadas con lóbulo adherente.

Frente: Grande, plana.

Perfil: Excavado en la raíz de la nariz.

Contorno frontal de la cara: Escudo amplio.

Desarrollo de la cara: Tipo femenino. Esqueleto del cráneo: Mediano.

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: P. L.

Edad: Veintiseis años, aproximadamente.

Sexo: Femenino.

Estado Civil: Soltera.

Ocupación: Dedicada a quehaceres domésticos.

Lugar de nacimiento: Coyoacán, D. F.

Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.

Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.

Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (15-IV-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 63 centímetros.

Busto sentado: 86 centímetros.

Braza: 1 metro, 59 centímetros.

Peso. (Desnuda): 59 kilos.

Anchura de hombros: 36 centímetros.

Perímetro torácico: 85 centímetros.

Perímetro abdominal: 76 centímetros.

Perímetro Pélvico: 95 centímetros.

Circunferencia del antebrazo izquierdo: 23.5 centímetros.

Circunferencia de la mano izquierda: 19 centímetros.

Circunferencia de la pierna izquierda: 31.5 centímetros.

Longitud de la pierna izquierda: 84.5 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Braquicéfalo.

Longitud máxima: 18.10 centímetros.

Anchura máxima: 14.50 centímetros.

Indice cefálico: 80.00

Altura. (Método de Hrdlicka): 13.50 centímetros.

Indice medio cefálico de altura: 82.80.

Módulo cefálico: 15.36

CARA

Longitud mento-nasio: 11.60 centímetros.

Longitud mento-crinio: 17.00 centímetros.

Anchura nasio-crinio: 5.40 centímetros.

Anchura bi-zigomática máxima: 13.00 centímetros.

Indice facial: 89.23.

Indice fisonómico: 76.47.

Diámetro frontal mínimo: 10.20 centímetros.

Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Mediana.
Cabeza: Grande.
Cuello: Corto y algo delgado.
Brazos: Cortos y algo gruesos, con poco depósito de tejido adiposo.
Piernas: Cortas y algo gruesas, con poco depósito de tejido adiposo.
Manos: Chicas y huesosas.
Pies: Chicos y huesosos.
Hombros: Rectos y medianos.
Torax: Amplio, con poco depósito de tejido adiposo: TIPO ATLETA.
Abdomen: Poco tenso, con poco depósito de tejido adiposo.
Columna vertebral: Recta.
Pelvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Abundante.
Vasos.
Arterias: No visibles, blandas.
Pulso: Frecuencia: 78 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.

CASO NUM. 50.- FICHA DE IDENTIFICACION

(Pabellón de enfermos mentales diversos. No pensionistas, de primera.)

Nombre: A. J.
Edad: Veintiocho años, aproximadamente.
Sexo: Femenino.
Estado Civil: Soltera.
Lugar de nacimiento: México, D. F.
Lugar de residencia: Mixcoac, D. F.
Diagnóstico: ESQUIZOFRENIA SIMPLE.
Historia clínica en el Manicomio General de la Castañeda. (23-VII-1930).

MEDIDAS

Estatura: 1 metro, 56 centímetros.
Busto sentado: 81 centímetros.
Braza: 1 metro, 56 centímetros.
Peso. (Desnuda): 43 kilos.
Anchura de hombros: 37 centímetros.
Perímetro torácico: 75 centímetros.

Cejas: Abundantes y separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Ganglios linfáticos: Existen sin caracteres patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, cafadas y medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (15-IV-1930).
Comienzo de la pubertad: A los doce años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.
Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.
Comienzo de la calvicie: No la tiene.
Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.
Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Mediana. ATLETA.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ES QUIZOTIMICA.

HERENCIA: Ninguna. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto).

Perímetro abdominal: 67 centímetros.
Perímetro pélvico: 82 centímetros.
Circunferencia del antebrazo izquierdo: 19.5 centímetros.
Circunferencia de la mano izquierda: 17.5 centímetros.
Circunferencia de la pierna izquierda: 28 centímetros.
Longitud de la pierna izquierda: 76 centímetros.

CABEZA.

Deformación: Mesocéfalo.
Longitud máxima: 17.70 centímetros.
Anchura máxima: 13.40 centímetros.
Índice cefálico: 75.60.
Altura. (Método de Hrdlicka): 13.25 centímetros.
Índice medio cefálico de altura: 84.20.
Módulo cefálico: 14.78.

CARA.

Longitud mento-nasio: 10.70 centímetros.
Longitud mento-crinio: 16.60 centímetros.
Altura nasio-crinio: 6.40 centímetros.
Anchura bi-zigomática máxima: 12.00 centímetros.
Índice facial: 89.16.
Índice fisonómico: 70.17.
Diámetro frontal mínimo: 9.70 centímetros.

NARIZ.

Altura al nasio: 4.70 centímetros.
Anchura máxima: 3.10 centímetros.
Índice nasal: 65.95.

BOCA

Anchura: 4.80 centímetros.

OREJA IZQUIERDA

Altura máxima: 5.40 centímetros.
Anchura máxima: 3.20 centímetros.
Índice auricular: 59.25.

VIGOR

Mano derecha (presión en kilos): 17 kilos.
Mano izquierda (presión en kilos): 15 kilos.

OBSERVACIONES ESPECIALES

NINGUNA.

INSPECCION

Color de la piel. (Tabla de Broca): 21 de Broca.
Pelo. (Color, Tabla de Fisher): 4 de Fisher. Carácter: Lacio.
Cano: Ligeramente. Calvo: No.
Mostacho y barba. (Color, Tabla de Fisher): No hay caso.
Ojos. (Color del iris, Tabla de Martín): 3 de Martín. Color de la conjuntiva: Ligeramente congestionado. Tamaño: Mediano.
Cara: Alargada.
Borde orbitario: Poco saliente.
Porción cartilaginosa de la nariz: Delgada, blanda.
Porción ósea de la nariz: Mediana.

Punta de la nariz: Afilada.
Boca: Chica, bien dibujada.
Labios: Algo gruesos.
Prognatismo alveolar: No existe.
Mentón: Afilado.
Laringe: Poco prominente.
Dientes: Medianos sin alteración.
Encías: Planas, sin alteración.
Orejas: Medianas, bien implantadas. Lóbulo adherente.
Frente: Mediana. Gibas frontales poco marcadas.
Perfil: Algo convexo.
Contorno frontal de la cara: Ovoide alargada.
Desarrollo de la cara: Tipo femenino.
Esqueleto del cráneo: Mediano.
Asimetrías: Ninguna.
Deformaciones: Ninguna.

CUERPO. CONSTITUCION

Posición del cuerpo: Recta, erguida.
Esqueleto: Mediano.
Articulaciones: Medianas.
Musculatura: Débil.
Cabeza: Chica.
Cuello: Corto y delgado.
Brazos: Largos y delgados, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Piernas: Largas y delgadas, con muy escaso depósito de tejido adiposo.
Manos: Angostas y largas, huesosas.
Pies: Medianos, Planos.
Hombros: Rectos y medianos.
Torax: Cilindroide, angosto, con muy escaso depósito de tejido adiposo. TIPO TISICO.

Abdomen: Poco tenso, sin depósito de tejido adiposo.

Columna vertebral: Encorvada adelante. Cifosis dorsal.

Pélvis: Mediana.

SUPERFICIE DEL CUERPO

Piel: Morena.
Pigmento: Regular cantidad.
Vasos.
Arterias: No visibles. Blandas.
Pulso: Frecuencia: 95 por minuto, tensión media, amplitud media, rítmico.
Venas: No visibles.
Desarrollo del pelo: Abundante.
Cejas: Abundantes, separadas en la línea media.

GLANDULAS Y ORGANOS

Organos genitales: Medianos.
Tiroides: Sin alteración ostensible.
Gánglios linfáticos: Existen sin carácter patológico.
Glándula mamaria: Tipo femenino, caídas, medianas.

FECHAS INTERESANTES

Comienzo del trastorno mental: (25-VII-1930).
Comienzo de la pubertad: A los trece años.
Comienzo de la menopausa: No la tiene.
Comienzo de la adiposidad: No la tiene.

Comienzo del adelgazamiento: Ha conservado su peso.

Comienzo de la calvicie: No la tiene.

Comienzo de determinadas enfermedades: Ha sido sana.

Anomalías sexuales: Ninguna.

CONSTITUCION FISICA: Débil. ASTENICO.

TIPO DE LA PERSONALIDAD: ESQUIZOTIMICA.

HERENCIA: NINGUNA. (Este dato fué tomado por interrogatorio indirecto.)

Capítulo Quinto

Conclusiones

EL resumen de los estudios llevados a cabo por Kretschmer, y consignados en su obra "Constitución y Carácter", asienta dos hechos que parecen comprobados:

Primero.—La frecuencia y predominio de los tipos leptosómico (asténico), atlético y displásico en los esquizofrénicos y,

Segundo.—La gran proporción de tipo corporal pícnico en los circulares.

Según las investigaciones llevadas a cabo por éste ilustre Profesor, encontró un porcentaje de dichos tipos en ambas psicosis como sigue:

"Esquizofrenia".— 70.3 por ciento asténico-atléticos; 19.4 por ciento displásicos; 2.9 por ciento pícnicos.

"Psicosis Maníaco Depresiva".—10.6 por ciento asténico-atléticos; 0 por ciento displásicos; 34 por ciento pícnicos.

De acuerdo con las investigaciones practicadas por mí en cincuenta enfermos del Manicomio General de la Castañeda (25 hombres y 25 mujeres) cuyos datos con todo cuidado he consignado en ésta tesis, llego a las siguientes conclusiones:

Treinta y ocho enfermos con diagnóstico de esquizofrenia presentaron el tipo corporal leptosómico (asténico) atlético.

Tres pacientes presentaron el tipo corporal asténico y son al mismo tiempo displásicos.

Un solo paciente esquizofrénico presentó el tipo corporal pícnico y ,

Ocho maníaco depresivos o circulares correspondieron al tipo corporal pícnico.

Como se ve en este humilde trabajo de investigación personal hay con pequeñas diferencias una corroboración más a la tan discutida teoría de los Biotipos de Kretschmer, ya que ratifica lo afirmado en sus dos postulados.

UNIVERSIDAD NACIONAL
FACULTAD DE MEDICINA
ENE 4 1981